



RS Tamba, Yasuyori
180 Ishin ho
J3T3
1935
v.4

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



問 顧

井上通泰先生
山田孝雄先生
新村出先生

正宗敦夫

編纂
校訂

醫心方

自十四卷
至十七卷


合資
會社

日本古典全集刊行會壽梓



傳世出 漢堂
 山田氏 藏書
 卷上 面 李 氏 主

五 齋 軒 夫
 刻 書



RS
 180
 J3 L3
 v. 4

日本古典全集 漢代詩書卷



醫心方卷第十四

後五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿称康頼撰

治卒死方第一

治中惡方第二

治鬼擊病方第三

治客忤方第四

治魔不寤方第五

治尸厥方第六

治溺死方第七

治契喝死方第八

治凍死方第九

治自經死方第十

治注病方第十一

治諸尸方第十二

治諸瘡方第十三

治鬼瘡方第十四

治溫瘧方第十五

治寒瘧方第十六

治淡實瘧方第十七

治勞瘧方第十八

治嶂瘧方第十九

治間日瘧方第二十

治連年瘧方第二十一

治發作無時瘧方第二十二

傷寒證候第二十三

傷寒不治候第二十四

避傷寒方第二十五

治傷寒困篤方第二十六

治傷寒一二日方第二十七

治傷寒三日方第二十八

治傷寒四日方第二十九

治傷寒五日方第三十

治傷寒六日方第三十一

治傷寒七日方第三十二

治傷寒八日九日方第卅三

治傷寒十日以上方第卅四

治傷寒陰毒方第卅五

治傷寒陽毒方第卅六

治傷寒汗出後不除方第卅七

治傷寒鼻衄方第卅八

治傷寒口干方第卅九

治傷寒唾血方第卅

治傷寒吐方第卅一

治傷寒噦方第卅二

治傷寒臨方第卅三

治傷寒下利方第卅四

治傷寒飲食勞復方第卅五

治傷寒洗梳勞復方第卅六

治傷寒交接勞復方第卅七

治傷寒後頭痛方第卅八

治傷寒後不得眠方第卅九

治傷寒後汗出方第卅

治傷寒後目痛方第五十一

治傷寒後黃疸方第五十二

治傷寒後虛腫方第五十三

治傷寒手足腫痛欲脫方第五十四

治傷寒後下利方第五十五

治傷寒後下部痛方第五十六

治傷寒^{一九}腕^{二九}豆瘡方第五十七

治傷寒後食禁方第五十八

治傷寒^愛百合病方第五十九

治傷寒後癰方第六十

治卒死方第一

病源論云卒死者由三虛而遇賊風所為也三虛謂乘年

之衰^{タル}一也逢月之空^ツ二也失時之和三也人有此三虛謂而

為賊風所傷使

氣現

陰陽偏竭於內陽氣阻隔於外二氣擁閉故暴絕

二分

而死也若府藏氣未竭者良久乃蘇然必有兼挾鬼神

側多隔也

ヤ、ア

イキヌ

之氣而卒死者皆有須邪退乃活也

タキ、ア

シ、ウク

イキヌ

葛氏方治卒死或先有病痛或居常倒仆奄忽而絕

タシ、フシ 衣檢多急也

皆是中惡治之方

令二人以衣壅口吹其兩耳極則易人久可以竹筒

フセ、イ

カヘ、ウ

ツ、

吹之並側身速之莫臨死人上

以、タテ

我隨及急也

シ

又方以葱葉刺其耳口中鼻中面出者莫恠

キ

セ

ユ、イ

無血難治有血是治候也

シ、ル、シ、ナ、リ

又方以綿漬好苦酒中須臾出量死人鼻中手

案令汁入鼻中并持其手足莫令驚

又方以人小便灌其面數迴即能語此扁鵲法也

又方末皂莢如大豆吹其兩鼻孔中透則氣通

又方擣女青屑以重一錢上開口內喉中以水若酒

送之立活

又方灸其頸下宛々中名秉漿十壯又方灸心下寸

集驗方治卒死方

取牛馬矢汁飲之無新者水和乾者取汁

漿將
明堂經云
在頸前下
脈之下

又方取竈中墨如彈丸漿水和飲之須臾三四服之

又方梁上塵如大豆粒著竹筒中吹鼻中與俱一

時吹之 又方灸臍中穴 又方取竹筒吹其兩耳不過三

新錄方治卒死方

慈根慈根鳩取汁服六七合

又方桃白皮切一升水二升煮取八合一服之十里久不老

更服之

僧深方治卒死中惡雷氏千金丸方

大黃オホシ五分 巴豆六十枚 桂心二分 朴消三分 干薑二分

凡五物治下篩ツリ和白蜜治三千杵セウ脹如大豆二丸老小以

意量之スヘ

枕中方治卒忤惡鬼ツカ魘アツ魘ツ欲死者書額上作鬼字即愈

龍門方療卒死方

取繩圍死者ヒキ辟ウチ枕男左女右以繩當大椎ヒキ申繩向

下ヒキ當繩頭灸脊上五十炷又方薑汁灌鼻

又方以葱黃心刺鼻中入七八寸男左女右立驗トコロ

又方鵠コ韭汁灌鼻即活又方桂屑著舌下即活

治中惡鬼氣也方第二

病源論云中暑者是人精神衰弱為鬼邪之氣卒中^ソ也其狀卒然心腹^{七レカチリ}刺痛悶亂欲死也

廣濟方云卒中惡心腹^{コトク}刺痛去惡氣方

麝香一分^研 生犀角二分 青木香二分

為散空腹以熱水服方寸匕立愈

范汪方治卒死及心痛腹滿魔忤中惡三物備急丸方

巴豆一分^{去心皮} 大黃二分 干薑二分

凡三物異^{コト}槁巴豆治合丸^{セヨ}以蜜丸如大豆有急^急取三丸

以水和服之口噤者絞開^{ツヅケテ}令藥得入^{ツマミ}咽中

又方取坏水以刀三七刺^七中飲之良

集畧方備急散治卒中惡^心痛腹滿欲吐短氣方

大黃二兩^{金色}桂心四分巴豆一百枚

凡三物治合下篩取一錢以水七合服之

千金方治卒死中惡方

取牛馬屎汁飲之无新者水和于者亦得

又方^急葱心黃刺鼻孔中血出愈

又方灸兩脇下又方灸胃管十五壯

集驗方治中惡方

大豆二七枚以鷄子中黃白酒半升合和頓服之

又方用釜底黑塩カナヘシリウ丸三三指撮和水服之瞽門方同之

又方以度ハカ其兩乳中夾屈夾之從乳頭カクハフホ子向後肋間度セヨ

頭ハシ隨年壯セシラ又方灸胃管五十壯

廣利方療中惡客忤丸垂死方

麝香錢重研タク和醋和二合服之即差

葛氏方古華他治卒中惡短氣欲死者方

菲根一ホシウ杞ホシウ烏梅ホシウ十枚カラハシカア茱萸半升以勞水一斗

煮之以病人櫛肉中三沸櫛浮者生沉者死

煮得三升飲之又方灸足兩母指ツボ上甲後叢

毛中各十四壯即愈

新録方治卒中惡方

豉一升塩七合水四升毛煮取一升二合分再服之

又方桃白皮切一升水二升毛煮取八合一服之

又方生昌蒲根切三升搗絞取汁服四五合

又方酒服桃人末毛方寸匕毛李人末毛佳

又方伏龍肝末水服二方寸匕

又方取竹木中虫屎水毛服方寸匕

又方塩一升水二升毛煮臨消二服取吐逆

治鬼擊病方第三

謂

患此新發
也或言痛

病源論云鬼擊者諸鬼厲之氣擊著於人也得

之无漸卒著如人以刃旁刺狀胷脇腹内絞急切

痛不可拆按或即吐血或鼻口出血或下血一

名為鬼排排言鬼排觸於人也人有氣血虛弱精

魂衰衰忽與鬼神遇相觸突致為其所排擊輕者

困而獲免重者多死也

葛氏方治鬼擊病方

以淳苦酒以吹入兩鼻孔中

又方灸鼻下人中一拉立愈不愈可加炷數也

灸方灸鼻

又云治諸飛尸鬼擊走馬湯方

巴豆二枚カクモウサネ杏仁二枚クタクイシ合綿裹椎合ヒネリ碎投契湯二合

中ヒネリ指捻令汁出ヒネリ云白便シメツ與飲之シメツ如食シメツ項下便老老

小量之

僧深方治鬼擊方

塩一升水二升和之カク攪令釋ヒネリ作汁飲之ヒネリ令得吐ヒネリ則

愈良

新錄方治鬼擊病方

搗薤汁灌オホミラ鼻中如杏人許須臾老好コシ

千金方治鬼擊病方

艾如鴨子大三枚トモキヤ分リ水五升モ煮取二升頓服之

又方灸膺上一寸セ壯又灸膺下一寸三壯

治客忤方第四

病源論云卒忤者一名客忤謂邪客之氣卒犯忤人精神也此是鬼厲之毒氣中惡之類也人有魂九魄九衰弱者則為鬼氣所犯喜於道間門外得之

葛氏方客忤死者中惡之類也喜於道間門外得之
令人心腹絞痛コトク脹滿氣衝ツカ心脅不即治必斃人治之方
以水漬粳米取汁三升飲之口已禁者以物理ヒツ發
內之 又方銅器若凡器盛熱湯先以衣三重
藉腹上乃舉湯器著衣上湯轉冷者去衣セキチ
器親完大冷者易以熱湯取愈也

又方搏書墨水和服一錢上

又方繩橫度其人口以度々磨去四面各一處ハカリ

各三壯令四火俱起

又方灸鼻下人中卅壯令切鼻柱下^{セメ}

又方橫度口中折之令上頭著心下灸下頭五壯^{追セ}

又云已死者搏生昌蒲根絞取汁含之立愈^{ツボ}

千金方治容忤方

塩八合水三升^モ煮取一升半分二服得吐即愈

若小便不通筆頭七枚燒末水和服之即通^{ツカ}

又方灸巨闕百壯

范汪方治容忤方

取牛子矢半坏以酒三升煮服之

新録方治客忤方

搗生艾心取汁灌口中五合

又^方水洩^{アラク}飆^{コシキウ}帶^{オビ}服之

治魔^{モウ}不寤^{フシ}方第五

病源論云人睡眠則魂魄外遊為鬼所魔^{モウ}屈^{カス}其精神

弱者魔則久不得忤乃至氣暴絕所以須傍人助

愛并以方術治之乃獲也

集驗方治卒魔欲死方

搗生韭汁灌鼻孔中^{ハナシク}刺者并灌兩耳

又方未昌蒲吹鼻中末桂內舌下

又方令一人坐（此）頭首一人於戶外呼病者姓名坐人應（此）

曰人諾在便即得藥也（此）
今乘救急單驗方
井中呼之云云本脈也

又云喜魔及惡夢者方 枕真射香一子於頭邊（此）

又方帶雄黃男左女右（此）

又方作犀角枕佳 又方以席頭為枕（此）

又方以青木香內枕中帶之

千金方治魔不寤方

雄黃如棗大條（此）左腋下令人終身不肯魔（此）集

驗方固之

又方伏龍肝末吹鼻中

養性志云人魔クラ勿燃火トモシ變之魔死モシ不疑クラクシ聞變之吉但

得遠變之不得近而急變トトハセハナリ喜失魂ハナレ魄

救急軍驗方療魔死方

引牛臨鼻シハラクア少時即活又方齧クハ其足オホエヒ梅柏オホエヒ爪甲際活

范汪方治魔死符法魔死未久故可活方

書此符燒令黑以少水和之置死人口懸鏡

死者耳前擊ウ鏡呼死人不過半日即

生廳鬼鬼丹書之

新録方若魔不悟者方

酒^モ脹^モ發^モ灰一撮許 又方搗^{ソク}蒴^ク藿^ク根^ク莖^ク取^ク汁^ク服^ク之

治尸厥方第六

病源論云尸厥者陰氣逆也由陽脉卒下墜陰脉卒上外^{フホル}陰陽雜居營衛不通真氣^{マコトキ}厥^{ケル}乱容邪乘之其狀如死猶^{タカシ}微有息而不恒脉尚動而形元知也聽其耳內循^{ウツク}有^ヒ如^ヒ嘯^ヒ之聲^ヒ而股間^{アタハカナル}聽者^ヒ是也

葛氏方云尸厥之病卒死而脉猶動是也

以管吹其左耳自極イタ三過復吹右耳三過即起

又方搗昌蒲以如棗核大著耳舌下

又方灸鼻下人中七壯 又方灸壺中穴二十七壯

又方灸陰囊フクリ下去大孔一寸百壯若婦人者灸兩乳

中間

又方以昌蒲クタイ屑著鼻兩孔中吹之令入以桂屑

著舌下云扁鵲治楚王法也

已上二方集驗方
龍門方同之

集驗方治厥死如尸不知人心下餘氣扁鵲灸法

以繩圍病人臂腕ウデ男左女右申繩從太椎上度下

之灸繩頭脊上五十壯

范汪方治尸厥方以梁上塵如豆暑箱中吹鼻中與耳同時

吹之 又方生薑汁灌口中

新錄方治尸厥方

取葱白一升水二升煮取一升頓服之

又方酒服桃人末方寸匕

救急單驗方尸厥死方

灸兩足大指甲後叢毛內七壯華他云二十七壯

治溺死方第七

病源論云人為水所浸溺水從孔竅入灌注府藏其權肉

故死若已^{已故}樣救得出即泄^{モラシシタ}瀝其水令氣面得通便活

又云經半^{タラ}日及一日猶可活氣已絕心上膈亦可治之

小品方治溺^{シホシ}水死已經二宿者可活方

檮皂莢作末以綿裹內死入下部中須臾牽出

即活也

又云治溺^{シホシ}水死方

以竈灰布着地令厚五寸以^{ナラ}甑^{コシキ}倒覆灰上以溺人

覆^{フツセ}伏甑上口中水當出也覺^{オホエ}水出復更別熬^{イリ}灰

令暖^{アタタ}量之溺^ナ人口中水已出極多便去甑即

以暖灰壅溺人通身但出口鼻耳セ小時便蘇シハラクヤ

醒則活也イキヌ

又方令二健人抱溺人倒卧ツチキ瀝溺人水出盡便活也サカモト

葛氏方溺死一宿者尚可活治之方

倒懸死人以好酒灌其鼻立活ハシキ龍門方同之

又云身尚温者取竈中灰二石餘埋人後頭至足即活ナラ

又方便脫暖釜覆之取溺人伏其上腹中水出ヌイアタリカケルウツセ

便活

千金方治落水死方

酢灌鼻

又方裹石灰内下部中水盡出即活

又方但埋死人暖灰中頭足俱沒カケシ准用七孔アノ孔

錄驗方治溺死方

灸膻中

集驗方治溺水死方

焚沙イリ以覆死人使上下有沙但出鼻口中沙温

濕頭ハルホウ易之シ

音楊傷寒

治契賜死方第八

病源論云夏月炎契人冒涉ツカシ途路契毒入内与五藏

依循及

相并客耶熾盛鬱ツマナ不宣散卒絕陽氣暴權經

絡不通故奄然悶絕謂之暈也然此乃外邪所擊
真藏未壞ヤツシ若便遇治救氣宣フヒ則蘇也夫熱暈不可
得冷レ便死

葛氏方凡中熱暈死不可使卒得冷レ便仍死矣治之方

以泥作正統暈人齋使三四人更溺其中

又方亦可屈草帶之可扣ツク凡腕底若脫車轢カモ

以著暈人齋上取令溺不得流玄而已此道路窮

急元湯當令人溺若有湯便可以与之

又方干薑橘皮甘草末少レ內熱湯中令稍ツ咽

勿頻多之可煮之

小品方治中熱暈方

取路上墊塵土以壅其心上小冷復易之氣通乃心
又方偃卧暈人以草帶圍膺上令人溺膺中
即愈 又方濃煮藜飲之至三升良効

千金方治熱暈方

張死人口令通以暖湯徐徐灌口中小舉死人
頭身令湯入腸須臾即蘇

又方灌地漿一盃即愈

又方杞ト子上若鷄著心前熨之フセ

又方地黄汁一盃服之

又方但以イシ契レ去及イシ契レ灰レ去壅其心上佳

治凍死方第九

多貢反

コイシ

凍音重寒也詩去凍其心風

病源論云人有在於途路逢淒風苦雨繁霜大雪衣

服ウセ沾濡ウレフ冷氣入藏致令陰氣閉於キ內陽キ絕於外榮

衛結シラリ滯シラリ復不流通故致噤絕而死若早得救療五

溫氣通則生

又云凍死一日ナラ猶可治過ナ此則不可治也

葛氏方治冬天墮水凍四支直口噤截有微氣方

以大器多墊灰使煖囊盛以薄其心上冷復

易心暖氣通目則轉口乃得開溫酒及作

粥清稍々含之即活若不先溫其心便持火

灸其身冷氣与火并則死勿為也

千金方救急
軍醫方皆同之

治自縊死方第十

病源論云人有不得意至者多生忿恨性トコロハ自縊以

繩物繫頸自懸挂致死呼為自縊

又云自縊死且至暮雅已冷必可治暮至旦則難治

此謂其晝則陽盛其至氣易通也夜則盛其氣難

通也

又云夏則夜短又熱則易治

又云氣雅已斷タエ而心微溫者一日已上猶可治

又方用罰衣覆其口鼻兩人吹其兩耳即生

小品方治自縊死方

傍人見自經者未可輒割繩キル必可登物令及其頭即

懸牽頭髮舉其身起令繩微得寬也ヤウ別使一人堅塞

兩耳勿令耳氣通又別使一人以葱葉刺其鼻中吹

令通又別使一人醫死人兩踵根待其蘇活乃止也

又方治自經死慎勿割繩也繩卒折氣頓泄去便死

不可復救也徐テ扼死人漸ナラ々縊令繩漸寬也然後解

下之心シルセ下尚溫取雞雌雄無在板翅毛去勿令得飛

也置地逐之竟完走雞令極久者其冠當黑心急

以尺物撥死人口開便牽雞頭上割雞冠ヒ折取五

臨死人口中至喉咽氣便通カヒラ

千金方治自經死方

凡自經死勿截繩徐ナラ扼解之心下尚溫者其得反翳能覆山第又聲類

席也風俗
通云翳也
翳謂也

口鼻兩人吹其兩耳

救急單驗方同

又方藍青汁服之

宇治本无く藍青汁有り

又方梁上塵如大豆各内簞中四人各捉一簞同

時兩耳兩鼻昂治

又云五絶方

一日自経二牆壁三日溺水四日魔魅五日產乳

絶皆以半夏ホソクア一友細下コナカ篩丸如大豆内鼻中愈

集驗方治自経死方

鳩皂荚細牽屑取カハフチ アララネクセ如胡豆吹兩鼻孔中心タ軍

用皂莢モ二好ウシ

葛氏方云自經死久難ナラ已久心下尚微溫ナラ猶可治也治之方
未皂莢以葱ヤ葉吹ウ內其兩鼻孔中

又方以蘆管吹其兩耳極ナ則易入取活乃心若
氣通者少以桂湯稍ウ咽徐ウ乃以少ウ麝清皂
龍門方療自經死方

皂莢末如胡豆許吹兩鼻中ハチ速ハチ即治

治注病方第十一

和建

病源論云凡注之言注也謂邪氣俱注人身內故名爲

注此由陰陽失守經絡空虛風寒暑濕飲食勞倦
之所致也或卒死之氣或卒犯鬼物之精皆能成
此病其變狀多端乃至卅六種九十九種而方不
皆顯其名也ヤラハ

僧深方云西王母玉璽赤丸備急治尸注卒惡水陸
毒螫万病方月略又 一名耆婆丸

武都雄黃一兩 赤如鷄冠 八角大附子一兩オウ 炮稱イリヘカケ

梨蘆一兩ヤイウシラ 上丹沙一兩不使有石者 白礬石一兩練之一日一夕

巴豆一兩去皮蟄令紫色稱之 一方有真朱一兩

凡六物悉令精好先治巴豆三千杵昌ラ又次內礬治三千杵石次內梨

蘆治三千杵次內雄黃治三千杵キホ次內白蜜治

三千杵之可從此更治方杵取佳有加真朱二兩者

若不用丹沙而內真朱二兩無在也イル生礬石黑礬石皆

可用不必白色者巴豆勿用兩人者又方別シモ鳩梨蘆ナラ

附子下フルア後乃更稱之カキヒ又一方每內藥輒治五百杵輒內

少蜜トハシラ忍藥飛鳩都畢ルヘ乃更治万杵合藥得僮子治

之ナカラ大佳無僮子但九人三日ナカラ瘠戎乃使之合藥用建

除日天清无雲霧日向月建藥成密之ナカラ勿令泄著

清紫慶大人脹之皆如小豆但丸數之无常此藥

治万病无所不主方上雖不能具載故略說可若本

病將脹者禁食生菓生菜猪突脹以下病者宿

勿食明且脹二丸不知者飲暖米飲以發之令下不

心飲冷水飲心之病在胃上吐下者下或但意氣

而愈或食不消腹堅脹或痛脹一九立愈風疝寒

疝心疝絃疝每諸疝發腹中急痛脹二九積寒

熱老痞蛇痞脹二九腹脹不得食飲脹一九卒苦

寒熱注來脹一九卒開格不得大小便欲死脹二九

符部多腹內結病也

エカハラ

エキトメ

セ

大

アタタ

音山腹急痛也

音喉腹中病也

瘕結脹一九日三服取愈若微者射崩九甚良下利重

下脹一九便新ヤム或復天行下便新卒上氣之但出不入及

逆氣衝喉暴積聚者服二九日無瘕未發服一九已發

服二九便新小兒百病痞寒中及有瘕ナラ百日半歲者ナラ以一九

如棗米著乳頭ハシ與脹之下ア一歲以上ナラ服如麻子一九日三ナラ以飲

脹小兒大腹及中契惡毒食物不化結成堅積ナラ皆令將

脹一九ナラ可以塗乳頭使小兒乳之傷寒勅色及時氣病ナラ以

煨酒脹一九厚覆取汗アセ即差若不汗復酒脹一九要ナラ化

取汗欲行視病人脹一九以一九著頭土行ナラ无所畏ナラ

醫心方卷十四

二下

瘦

所枯又作瘦

瘦上俗

通下非

也

至死喪家帶サ丸辟百鬼病苦淋路ヤセ痢ヤセ瘦百葯

酸疼脹ヒンヤヒンカ丸日三婦人產生餘疾及月水不ハナハナ通ハナハナ及来

注不時脹アラ二丸日二卒霍乱心腹痛煩滿吐下手

足逆冷セ脹二丸注病百種病不可名將ナナル脹二丸

日再若腹中如有虫欲鑽ツキ腸出狀急痛一心ツ一作

此是風氣脹二丸若惡瘡不可名癰疥疽ハ以膏

若好苦ハ酒ハ和藥先ハ監湯洗瘡去痂カヒタ拭令ツ燥ハ以藥

藥塗之即愈惡風遊心不得氣息脹ハ丸即

愈耳出膿血汁及卒聾タラ以穀裏裏ツ二丸塞耳

耳孔中即愈癰腫昨本又音節クヒ癰癰癰癰及欲作癰ナ以着

苦酒和藥塗之齒痛以小丸綿裏ハ着齒孔中クハ咋ハ

之苦寒契注来服二丸苦馳瓊イラギセリ蛭蠅ハ所レ中ヤウ傷也也

及獾ク犬狂馬シク所咋ク以苦酒和塗瘡中并服二丸

即愈卒中患欲死不知人以酒若湯水和二丸

強開口灌ハ准中捧坐セ令下若獨宿セ山林澤之中若

冢墓間燒一丸百鬼ニ走ハ去不敢ツカ近人ハ僻飲ハ而飲ハ淡

飲服一丸以臈和一丸如彈丸イシ着ア絳囊中以繫チ臂

男左女右山精鬼魅皆畏ツ之中ヤ溪水毒服二丸已

有瘡在身以苦酒和三四丸塗瘡上憂患之氣結

在胃中苦連噫及咳其多飲復瘳胃中夾痛其多飲復瘳脹如麻子三九日

三愈婦人胃中苦滯氣息不利小腹堅急繞臍

絞痛モリ漿脹如麻子モ丸稍增之如小豆心腹常苦痛切モリ

及中契脹ホル一丸如麻子日三服五日愈男女耶氣鬼

交通歌哭無常或腹大經絕狀如任身皆將脹三

丸如胡豆大日三夜一又以苦酒和之如枳アキ且以塗え

手間使心主暮又夕々以塗足三陰交及鼻孔七日

愈又將脹如麻子一丸日三服日心腹中三虫宿勿食

明平且進牛羊糞タラシ三臍タラシ須臾便服三丸如胡豆

日中當下重過日中不復服二丸必有爛垂下小兒

寒熱頭痛身熱及吐タラシ一服タラシ一丸如麻子小兒瘡癰ヤセ

丁矣不能食タラシ不化將服二丸日三又苦酒タラシ和如粉塗

陰兒腹良風目赤或痒視漠目不明之良復出爛皆タラシ以蜜

解如粉以塗タラシ注目此目昔頭平風腫セ以苦酒若膏タラシ

和塗之即愈風頭腫以膏和塗之以絮裏之タラシ若

為蝨毒所中吐血腹內如刺服一丸如麻子稍益タラシ

至胡豆亦以塗鼻孔中以膏和通塗腹背亦燒之

之自薰治鼠癭以脂和塗瘡取駁舌狗子舌之即愈也

千金方治一切注無新久方

先作卧灸兩乳兩邊耶下三寸第二助間隨年壯可

至三百壯又心下三寸灸六十壯又兩手大指頭灸七壯

又玄十注丸主十種注氣注勞注鬼注冷注生人注死人注尸注水注食注土注等諸注方

注食注水注等諸注方

雄黃兩巴豆二兩 人參一兩甘草一兩蒿本一兩

桔梗一兩附子一兩

皂莢一兩枳實一兩麥門冬一兩

十味空腹脹一丸如小豆日二以知一丸為度有驗

葛氏方云注病即是五尸中之尸注又狹諸鬼耶為害也ナレ

大略令人寒契淋瀝不語之良沉不語之良嘿不語之良不的アキカラ知所苦而無處不トイフ

惡累年積月漸以至死カセキ後復注易傍人乃致臧門ツキ

覺ツキ似此疾者便宜急治之方

桃核人五十枚研之以水一斗煮取四升一服盡セキ

當吐病不盡二三日更作セシ若不吐者非注

集驗方治注病方

取素根白皮切二斗セウシ曝ス燒セ作灰湯淋取汁浸小豆ヒラセ

斗如此取灰汁盡道莖豆豆實豆作羊脂羹散此豆クシ

又云治鬼注病相染易盡門方

獺肝一具乾之下篩水服方寸匕日三神方千金方同

槎要方療惡症入心欲死無問遠近年月皆愈方

安息香羊兩為末酒服即愈救急單
驗方同之

又云療症氣莖無恒秉方

白芥子カラシ搗為丸服之礼又酢和塗隨手為驗

龍門方療惡症入心欲死方

獨頭蒜トコヒ一枝書墨化九如來大並搗以膏汁化九一小合頓服立差

又方取塩如鷄子布裹燒赤末酒服即驗

又方取枳布裹薄布フセハシタ庄上以耐斗ツシ盛火耐モリ之令汗出ツシ驗

新錄方云惡症方

塩五合竈窰カマクラヤ墨カマクラヤ三合水カマクラヤ三升モ煮塩消去滓頓服カマクラヤ立差

又方桃枝切三升水カマクラヤ四升モ煮取一升六合二服カマクラヤ之

范汪方治尸注毒痛注來方化九

燒髮灰杏子中人イリ瘳令紫色

凡二物カマクラヤ等膏和酒服梧子三九日三

救急單驗方療惡症方

阿魏藥脈二升和酒五老

又方桂三兩酒三升煮取一升分再服老

治諸尸方第十二

病源論云人身內自有三尸諸虫與人俱生而此虫忌惡能与鬼靈相通常接引外郎為人患害其茆茆作之状或沉々默々不的知所苦或腹_腹痛脹急或_{ツク}螺塊_{ツク}踊_{ツク}起或牽引腰脊或精神雜錯寢状多端葛氏方云雖有五尸之名其例皆相似而小有異者

一飛尸

變作无常

二道尸

通義典便作

三風尸

得風便作

四沉尸

遇寒冷便作

五尸經

變轉致大惡

又云凡五尸即是身中尸鬼接引外邪共為病害經術其有消滅之方而非世徒能用今復撰諸經要以救其弊方

雄黃一兩大蒜一兩搏令相和如彈丸者內二合漿酒中

服之須臾老耄更一服便心有尸跡者常宜蓄此

イフ
タラフ
勅思反

藥也

又方桂于薑人等末之塩三指撮熬令青末合水服

二方寸匕

新録方治飛尸方

灸脊中及兩旁相去三寸各五十主

又方桃白皮切二升水四升煮取一升六合分三服

又玄治道尸方

牛蹄^{ヒツメ}下五三指撮酒一盞下^ニ治風尸

又方燹艾以青布裹更熨^{カハル}又方燹大豆裹更熨^{ラセ}

又玄治沉尸方

灸大倉七炷

中炷也

又灸乳下一寸七炷

又方駿灰杏人蜜和丸如梧子一服七丸日二

千金方治道尸注方

桂心一兩 干薑二兩 巴豆二枚

三味下篩上トキ酢和カク如泥塗病上干即易之

又云芥子薄主道尸飛尸方

芥子カラシ一升トシ蒸ユ熟搗下篩以黃丹二兩攪カキ之カ作踈

布依盛之更蒸使熟薄ツツ痛上當更カ送ユ蒸依恒

恒使熟

治諸瘡方第十三

病源論云夏日傷暑秋必病瘧其入形瘦皮栗

堅也

以月一日菽當以十五日愈設不愈月盡解

今案有

復瘧載卷末

通云玄庖病多種各不同形有溫庖有寒庖有瘧

於林采及

庖有勞庖有鬼庖此五庖內應於五藏溫庖者先熱

病源論云瘧氣在腸助之間注血

而後寒、庖者先寒而後熱瘧庖者吐逆嘔宿汁

飯引注本

瘧瘧

而起於腸下則引腸下

腹中生絃瘧勞庖者不得用力鬼庖不可與飲食用

二

懸痛所云

用藥不得同

謂之懸痛

集驗方黃帝曰夫瘧瘧皆生於風夏傷於暑秋為瘧

云

音

瘡問曰瘡先寒而後熱何也對曰夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也問曰先熱後寒者何對曰先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也名曰溫瘡其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發名曰瘡瘡丁可及瘡也

治之方夫瘡必從四末始先其發時一食項用細ヒリ左纈繩ヒリ堅。

束其手足十指遇時乃解トナ

又方取大蜘蛛クモ一枚內蘆管中密塞管口繩キヒシク

係以^{カケル}縮頸過^ル發時乃解去^リ葛氏方同之

又方桃葉^{有核及葉也}二十七枚安心上^{ツイ}艾葉^モ葉上十四壯^{僧深方同之}

千金方治癰方

未發前把雄雞一頭著懷中時驚動令雞

作大聲無不^{イラ}老

又方故鞋底玄雨頭燒灰并花水^毛服之

又方未發前預灸項大椎尖頭^{化丸}漸灸過時心

葛氏方治癰病方

又方^{又方}多煮豉作湯飲數升合得大吐便斷

又方破一大豆玄皮書一^手斤作日字一^手斤作月字

左手持日右手持月吞之立愈向日服勿令人

知之

又方灸鬲^{九分}甲^{九分}鳩末酒服方寸匕至發時令

三服兼用火灸^灸无不斷

龍門方療一切瘡方

取恒山^{クキ}甘草^{クキ}等分鳩末和水服方寸匕吐即差

又方取蓮^ル鳩末三指撮以酒和欲^ル發前服之驗

范汪方治瘡方臨發時鳩大附子^{オウ}下篩以苦酒和之

塗背上

廣濟方療瘡方

恒山三兩ヒタシ以漿水三升浸經一宿剪取一升ヒタシ欲發ヒタシ

前頰脹之微吐差心无所禁忌

小品方ナニ斷瘡ナニ先大寒後大熱者方ヒタシ

小麦一升淡竹葉クレタケ一席口恒山三兩

凡三物以水五升宿漬明且煮取二升半

三服之

僧深方治一切諸瘡ナニ無不ヒタシ斷恒山丸方

大黃一兩一方附子一兩二兩恒山三兩炮龍骨一兩炙

凡四物治令下篩蜜和平且服梧子七丸分未

茲中間復服七丸臨發服七丸若不斷至後

後日復茲更服如此法甚神良

本草經云治瘡者モツラ葠草汁及生汁服之

本草替疑云治瘡燒猫屎ネコ為末酒服方寸匕

治鬼瘡方第十四

范汪方治鬼瘡方

丹書額言戴九天書臂言托九地書足言履九江

書背言南有高山上有大樹下有不流之水中
有神虫三頭九尾不食五穀但食瘧鬼朝食三千暮
食三百急々如律令書背言上高山望海水天門
亭長捕瘧鬼得便斬勿問罪急々如律令

瘧經

同之

又云平旦發者市死鬼恒山主之服藥訖持刀

杖賜及注死也

シテラ

モナ

食時發者鎡死鬼蜀木主之服藥訖持索

杖賜及

オホシ

日中發者溺死鬼大黃主之服藥訖持盃水

カツネクセ

晡時發者舍長鬼麻黃主之服藥訖持磨衡

黃昏菟者婦人鬼アラウネ細辛ヒメシキ主之服藥訖持明鏡

夜半菟者厭死鬼ヒメシキ黃芩ヒメシキ主之服藥訖持車軟乾

鷄鳴菟者小兒鬼オウ附子オウ主之服藥訖持小兒墓上析タ

草木

凡七物各一入治下後菟時加所主病藥一入當菟
日從且至菟時溫酒服方寸匕三服々訖必持所主病
物甚良有効

又云平旦オコル作者客民鬼也タル先作時令病者持衣如辞

去言欲遠出立愈

食時作者容死鬼也先作時令病者辭言欲歸之大道

上橋梁下逃之

禺ク中作者市死鬼也先作時令病者因結世械キツキ北向吐

此字誤守奪
掩安救又
抗也江

營ツクル人人埃い

坎也

日中作者溺死鬼也先作時令病者取盆水中著連南向坐

營い人人埃い

日跌チリ作者三死鬼也先作時令病者言吏捕汝庭中

晡時作者自經死鬼也先作時令病人當棟下卧以繩索大

續ル病者頭目入作者人奴舍長死鬼也先作時令病者

磨碓カラ間逃之

黃昏作者盜死鬼也先作時令病者踰去遠二無令

人知其家又定作者小兒鬼也先作時病者取小兒墓

上折草木空愈夜過半作者囚死鬼也先作時取司

實械空筌令病者持之因從出可榜ウチ笞汝者

夜半作者寒死鬼也先作時令病者溫衣營以埃持

桃枚枝飲食匪肉中無人知見紫此次上

鷄鳴作者乳死鬼也先作時令病者犯三藁席之疏

目應令持桃枝營以埃

三埃

如意方治鬼瘡方

發日早且取井花水丹書額作天獄字書脅作

脅獄字書背作背獄字左手作左獄字右手

作右獄字兩足心各作地獄字畢向東咒云日出

東方隱似沒晝罵日夜罵月瘡鬼不死當復

致清冷之鬼飲汝血北斗七星何不截急々如

律令三過咒便愈

又方計發日今夕可食鷄鳴起著衣履屣屣

随意出戶脫之速出勿顧入幽閑隱室緊閉戶

開字治本條一發音ハハレ抄作開字

屬

勿令人知脫人來呼^{トモ}勿應^{コタフル}過時勿飲食飢^セ
極^{トシ}但卧思之至夕乃還必^{ヤム}折也

通玄^鬼者或間^日或頻日^{ルルナリ}發作無時者此為鬼^鬼虐^鬼任
避之乃用飲食送遣^{リツヤシモシ}如三日不心用

恒山^{クセキ}三兩^{クセキ}豉^シ一升^{キツモツ}秫米^{ヒル}百粒^{ヒル} 蘇^{ヒル}七斤^{クツタク}研清酒

二升漬之一宿^ア早且服之得大吐則心

治温瘧方第十五

病源論云夫温瘧^{シツカシ}与寒瘧^{シツカシ}安舍温瘧者得之冬中^{アタ}
於風寒氣藏^{シキスル}於骨髓之中至春則陽氣大^シ發邪

邪氣不能出目遇大暑腦髓消鑠肌肉消釋

余灼又

楊杞石

理發泄故先契而後寒名曰溫瘧

石膏半斤 研碎 每三兩

地骨皮三兩

吸發及短氣

通玄玄溫瘧者吸發契而少寒心惛面赤發自於心方

玄參三兩

陳竹葉升

猪苓三兩

治寒瘧方第十六

水九升 黃取三升 分三服 相去如立里

病源論云寒瘧此由陰陽相并陽虛則陰勝

勝則寒發於內而并於外所以內外俱寒故病

發但戰慄而鼓頷

水ナギ シラキイナラ シトカヒ

通云云寒瘧者清々而惡寒毛豎發則引溫而少

滴色立夏

契方

朱沙四升

研

雄黃一升

研

人參四升

カフニクセ

恒山五升

クセキ

牡蠣シカキ四ノル分 熬ノル蜜丸如梧子一服七丸日再空腹

脹之用粥飲之

治淡實癰方第十七

病源論云謂病人膏肓先有停淡結實日感癰病

則令人心下交滿氣煩臨之セハ

范汪方治癰淡實不消恒山湯方

恒山クキ六分 甘草四分 知母ヤマトミ三分 麻黃カクネクセ三分 大黃オウ四分

凡五物切以水五升煮取二升分三服至葢時令盡

治勞瘵方第十八

病源論云凡瘧積久不差則表裏俱虛客邪未散真

氣不復故疾難暫繫間ルニセ小勞便發ハル

集冷方治勞瘧時不新衆治無効此方治之ルシ

生長大牛膝一大席口切以水六升煮取二升八ナレキナラシキ

再服第一服取未發前一食頃第二服取臨發

今案葛氏方云酒
三升漬一宿分三服

葛氏方云老瘧久不斷者方ヲル

末龍骨方寸匕先發タル一時以酒一升半煮三沸及ナラ

契盡服溫覆取汗五愈

又方灸鰓甲鳩尾涓脈方寸_二至_レ腧_ル時令三服兼
用火灸無_{ト云}不斷也

僧深方治勞瘵桃葉湯方

桃葉十四枚 恒山四兩

凡二物酒二升漬一宿露著中庭刀著器上明且
發日凌晨漉_{ボウクラカラムニシタ}玄澤_室後溫令煖_{一頓服之必吐良}

治嶂瘵方第十九

病源論云山嶂瘵此病生_{ナル}於嶺南帶_{タシガリ}山嶂之氣也其
狀寒熱伏作有時皆由挾溪源嶺嶂毒氣故也其病

重シ於傷暑之癰ウリモノ

宇治左九ノ藥局ナリ寺有

耆婆方治瘡癰要方

蜀恒山三兩 甘草二兩 光明砂一兩

三種鴆シロ節以蜜寒和丸如梧子未發前服三九ノ發時服二九發後服一九於後三日更服一服三日慎食

錄驗方治癰及嶂氣方

恒山二兩 甘草二兩 切以白絹大一升浸一宿ア去滓ハ

二服未發前一服臨發又一服任ア吐慎メ生ヒ冷ヒ酢ナ滑ナ酒セ

宗シ、ムキコ麵油アフラウキ膩房室アフラウキ

アフラウキ

ナアミク

治間日瘧方第廿

病源論云問曰瘧此由邪氣與衛氣俱行於六府而有時
相失不相得故邪氣內薄セリ五藏則道遠氣深故其行
遲不能與衛氣偕出トモ是以間日而作ヘクチ

集驗方治瘧或間日發或夜發者方

秫米キアラモチ百粒 石膏八兩碎 恒山ツツキ三兩 竹葉三兩

凡四物切以水六升漬藥覆一宿明且煮取取二分
三服取未發前一食頃第一服取臨發敬第二服當一
日勿洗手足面及嗽口ハカフ勿進食飲取過時ルチ不發乃燥

洗進食也并用餘藥汁塗五心及胸前頭面藥滓

量頭邊此方從來モウリ舊用神驗アリ

宇治本无ハ發背ヲ等病ハ

小品方斷癰恒山酒方治瘡癰先寒戰動地寒解壯熱

日ハタ々發間日發並斷方ニテヤル

癰申一兩 淡竹葉切三升恒山三兩 甘草三兩フタホホウシクアラハルトモ二酒三

升凡五物以酒漬藥刀景上覆頭安露地明且以水

七升煮取三升ハ五服未發前令盡當吐ハ極傷

多不必盡ハ割但禁飲水粽

治連年瘡方第廿一

范汪方治連年瘡不差牛膝酒方

牛膝草一杷并酒好酒中三升凡二物牛膝內酒漬中二宿明旦中

三服

錄驗方恒山治瘡湯十歲廿歲丸方

恒山二兩 甘草一兩 大黃二升 桂心六銖

凡四物切以恒山酒漬一夜諸藥以酒三升水二升煮

取七合頻服下吐愈

僧深方治卅年瘡龍骨丸神方

龍骨四升 恒山八升 附子三升 大黃八升

凡四物各治蓂鷄子和菽前脈七丸如大豆臨菽

脈七丸

効驗方治卅年癰恒山散方

恒山五クニ分 干漆四クニ分 牡蠣二ツカキ分 杏子二カラモリ分

凡四物下節獲酒脈方寸匕日三

治菽作無時癰方第廿二

病源論云夫衛氣一日一夜大會於風府則湊理開ツキ

則邪入オユル則病作オユル當其時陰陽相并隨其所勝負

則生寒熱故動作皆有早晏若府藏受邪内外失

守耶氣妄行所以休作無時

九

葛氏方治瘧發作无常心下煩熱方

恒山クキ二兩 甘草兩半 豉カキ五合 以水六升煮取二

升分再服當快吐仍新即飲食

セ

傷寒證候第廿三

五

病源論云經云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰

ナ

ナ

寒此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子

ナ

ナ

固密則不傷於寒夫觸冒者乃為傷於四時之氣

ヲカ

ナ

皆能為病而以傷寒為毒者以其最為致厲之氣

ナ

タ

焉即病者為傷寒不即病者其寒毒藏肌膚中至
春變為溫病夏變為暑病者カハ熱重於溫也ナ是以
辛苦人春夏必有必有溫病者皆由其冬時觸冒之
所致非時行之氣也其時行者是春時應溫而返
寒夏時應熱而返冷秋時應涼而返熱冬時應寒
而返溫非其時而有其氣是以一歲之中病無長少多
相似者此則時行之氣也

又云夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六
七日間其愈皆以十日以上

葛氏方云傷寒時行溫疫雅有三名同一種可而源
本小異其冬月傷於暴寒或疾行力作汗出得風
冷至春夏發名為傷寒其冬月不甚寒多暖氣及西
南風使人骨節緩墮受耶至春發名為時行其年歲
月中有厲氣蕪挾鬼毒相注名為溫疫如此詎候並相
似又貴勝雅言總名傷寒世俗同号時行道術者初
言五溫之度以此致大歸終是共途也

醫門方云凡傷寒病五六日而渴欲飲水不能多未宜與
也所以介者腹中熱尚少不能消之便作病矣至七八日

澱組立又
痺蒼
汗出也

大渴欲飲水然當与之常令不足勿極意云能一斗而
与与五升若飲而腹滿フクシ小便不利若喘アキ若臧セ弥不可与之
戢然大汗出是為已愈也凡得此病又能飲水此為欲
愈之候若小渴而强与シヒ之目此成禍者其數甚衆オホシ
傷寒不治惟第廿四

葛氏方云陽毒病面目斑々如錦文フナト喉咽痛下體膿血五日
不治死

陰毒病面目青舉ゴソ躄ヒナギ疼痛喉咽不利手足逆冷七カセトヒ上五日不
治死毒病發赤斑ナルツ一死一生

熱病未發汗而脈微細者死アセアエ

內熱脈盛躁發汗求不肯出者死ヒホ

汗雖出至足者猶死三二一

已得汗而脈猶躁音威威威熱不退者死

汗出而誠言煩躁不得卧音威目精乱者死コト

汗不出而臨音威臨者死汗出大下利不止者死

汗出而寒不止鼻口冷者死タル發熱而症腰掣ヒキ縱齒ホシ

斷者死不得汗而掣縱狂走不食腹滿背脊痛臨

亟者死

喘滿誠言直視者死 勢不退目不明舌本爛者死

欬而衄者死 大衄不止腹中痛短氣者死

衄而衄者死 大衄不止腹中痛短氣者死

喘咳下血身熱而大瘦削者死

手足逆冷而煩躁脈不至者死

大下利而脈疾及寒者死 下利而腹滿痛者死下利

手足逆冷而煩躁不得眠者死

腹滿腸鳴下利而四肢冷者死 利心眩冒者死

腹脹嗜飲食而不得大小便者死

身面黃腫舌卷身糜^ア者死

不知痛處身面青^シ不^セ欲^モ語^{ハム}者死

目^{ツナカワラ}匡^{オナ}陷^ナ不見^ナ人口^ナ干^ナ課^ナ語^ナ手脩^{ツク}衣縫^{ロウ}不得^ナ眠^ナ者死

始得使一身不收^キ口^ナ干^ナ舌^{カク}焦^ナ者死

疾始一日腹便滿身熱不食者死二日口身熱舌干者

死三日耳聾^ツ陰縮^ツ手足^ツ冷者死

四日腰下至足^{タリ}熱而上^ナ冷腹滿者死五六日氣息高

者死

七八日脉^カ微^ハ于^ナ而^ナ溺^ナ血^ナ口^ナ干者死

脉若不數三日中當有汗シヤセ若无汗者死

大素經契病死候九

第一汗不出く不大モリ灌發者死 第二泄而腹滿フクル甚者死

第三目不明契ヤ不ヤ已者死 第四者耆老人嬰兒契而腹滿者死

第五汗不出合ツク而合ツク者死 第六舌本爛不ヤ已者死

第七歐而孔クタル汗不出く不ヤ已死 第八髓契者死

第九契而孔クタル瘞者死

避傷寒病方第第セクル第

靈奇方避時氣疫病法

正月未日夜以蘆炬火照井及廁カヤ中百鬼走不入二

又法正月朔日寅時用黃土塗門トヒラ扉方二寸

又法用牛矢塗門戶方負二寸

又法正月且若十五日投麻子小豆各二十七枚入於井中

避一年濕病又法正月且吞麻子小豆各二十七枚辟却トヒラ濕鬼

又法庚辰日取鷄犬毛於門外燒烟之トヒラ避濕疫

又法五月十五日トヒラ中取井花水沐浴トヒラ

避邪鬼

又法五月戊己日沐浴避病

又云使溫病不相易法以繩度所
住戸中屈繩燒斷

醫門方避溫疫法

赤小豆五合アカアヅキ以新布五寸ナル裹内井中不至底少許

三日漬之平晨東向男吞二七女吞一七病者同トモ

床不相染

又云療溫病轉相ウツク注易ツキ乃至リ戚門傍至外人無有
看服此藥必不相易方

鬼箭羽ヲトクナシ二兩 鬼臼ヌハクア二兩 赤小豆二兩 丹參二兩

雄黃二兩研 鷄冠色者 搏多篩アル蜜九小モ如梧子脹一九日二

三与病人同床傳衣不相染神驗

千金方云溫病時行令不相染方

立春後有庚子日溫蕪菁蘆汁合家大小並服

不限多少槪要方同之

又方常以月望日細剉ニカキ東行桃枝キリ煮湯浴之

又方又方常以七月七日合家吞赤小豆向日吞二枚桃樹蠹矢末水脹方寸匕

集驗方新溫方二月且取東行桑椹大如拍懸門カサ戶上又人帶之

得富貴方云欲至病人家手中作鬼字

王稍方云屠蘇酒治惡氣溫疫方

白木桔梗フキナ

蜀林桂心フキナ

大黃オウ

烏頭オウ

校櫻セウリ

防風フウ

凡八物

細切サイ

緋帛盛イシ

以十二月晦日中

懸沉井中

勿令至泥

正月朔且出藥量三升溫酒中屠蘇之向東戶飲之各

三合先從小兒起一人服之一家無病一家飲之一里无

恙飲藥三朝還量井中

仍歲飲之累代無患ヤナヒ

葛氏方云老君神明白散

避瘟疫方

白朮二兩桔梗二兩半烏頭一兩附子一兩

細辛二兩アララフネクヒ

凡五物搗篩歲且以溫酒服五升一家有藥則二里

無病帶是藥散以行所經過病氣皆消若他人有

得病者便溫酒服一方寸匕

又云度嶂散辟嶂山惡氣若若有黑霧鬱勃及西南溫風皆為疫癘之候方

麻黃五カネノセ分 蜀椒五シカマ分 烏頭二シカマ分 細辛一分 防風一分

桔梗一分 干薑一分 桂心一分 白朮一分

凡九物搗篩平且以溫酒服一錢上

又云新溫病令不相染著法

新汲水ヒツカ浸長七寸ヒツカ盜著病人卧席下集驗方

又方密以艾灸病人床四角各一九勿令病人知之

又方以^ス罽^ス罽密量病人卧席下勿令知之

又方附子^ス三枚小豆七枚令女人投井中

治傷寒困^{クルヒ}篤方^{ツツ}第廿六

葛氏方治特行^ル垂死者破棺千金湯方

咬咀^{ツク}見第卷

苦^ク參一兩^{ツク}咬咀^{ツク}以酒二升煮令得一升半盡服

當^{ツク}吐毒^{ツク}千金方

同之

本草蘘^{カシタ}敢^{カシタ}注去人屎乾者燒之炆絕水漬飲汁名

破棺湯也主傷寒^{今葉葛氏方世人謂之黃龍湯}熱毒

青波方治^{ツク}熱病困苦者方

生麥門冬ナツメ小一升去心搗碎ツツキ熬イ內井花水絞取一升

半及冷ナカ入三脹契ナカ甚者吐即老

集驗方云凡除契解毒無過ナカ苦酢ナカ之物

崔禹錫食經云梨除傷寒時行為妙藥也

通玄經高在元經同古梨雜為五藏刀斧足為傷寒妙藥云々

治傷寒一二日方第廿七

病源論云傷寒一日大陽受病大陽者小腸之經也
故先受病其脉絡於腰脊ツツ至於頭項故得病一日而
頭項腰脊痛也以下次第如常

葛氏方云傷寒有數種庸人不能別今取一藥兼治
治者若初舉頭痛突契脈洪起オホキ一二日便作此慈是義湯

慈白一盾口致ミ一升以水三升煮取一升頓服取汗

集驗方小兒

尿三升

又方葛根クモ四兩水一斗煮取三升內致一升煮

取升半一服

又方鳩生葛根汁服一二升佳

治傷寒三日方第廿八

新錄方治傷寒溫疫三日內脈洪浮頭痛惡寒壯契身

體痛者方

葱白一升クキ豉一升クキナシ艾子三七枚桂心二兩無用生

薑三兩以水七升煮取二升ハ分三服之

治傷寒四日方第廿九

玉蘗方傷寒四日方

茱萸ニカワリホソ二七枚以水一升煮取五合一服當得吐之

治傷寒五日方第卅

范汪方治傷寒五六日化臨而利者黃芩湯方

黃芩三兩ヒコニ半夏ホソク半升人參二兩桂心二兩干薑

三累 大棗十二枚 凡六物水七升モ煮得二升八モ再服

通玄云五日外肉涼內熱者傷之宜服升麻湯方

升麻二兩トリヲアミシクセ 黃芩三兩 芍子二兩クサナシ 大青二兩ハトリクセ 大黃二

兩別浸ヒタセ 芒消三兩 水八升モ煮取二升半ハ三升

脈モシ如不利盡脈之ト

治傷寒六日方第卅一

范汪方治傷寒六七日不大便有瘀血方

桃人モウサネ廿枚葵イル 大黃三兩 水蛭ヒル十枚コナ 蠅虫コナ廿枚

凡四物搗篩為四丸卒脈當下而不下復服之

治傷寒七日方第廿二

千金方傷寒吐下後七八日不解結熱在裏表俱熱時

惡風大溫舌上干而煩飲水數升白散湯方

毋六兩 石膏一升 甘草二兩 粳米六合

四味水一斗二升煮米熟去滓分服一升日三

葛氏方若已六七日熱盛心下煩悶狂言見鬼欲起走者

方絞糞汁飲數合至一升世人謂之為黃龍湯陳

久者弥佳

治傷寒八日方第廿三

傷寒八日方第廿三

日一

錄驗方治傷寒八九日腹滿外^{フク}內有^ル契心煩不安^ル並胡湯方

蜣^{ヤトコ}母二兩 生薑三兩 薤^コ白三兩 並^{ハナ}胡八兩 大黃三兩

黃芩^{ヒラキ}二兩 甘草一兩^カ 人參一兩 半夏^{ホソク}二兩^洗

來^{オホキ}蠟^カ蛸^{フク}七枚^カ

凡十物切以水一斗^モ煮得三升溫飲一升日三

治傷寒十^リ日以上方第卅四

千金方治傷寒^シ熱病十日已上發汗不^レ解及吐下後諸^シ熱

不除及下利^ル不^レ心皆治之方

大青^{ハトク}四兩 甘草二兩 阿膠^{ニカ}二兩 豆豉^ク一升

四味以水八升煮取三升頓服一升日三

治傷寒陰毒方第廿五

集驗方云陰毒者或傷寒初病一二日便成陰毒或服藥湯

六七日以上至十日變成陰毒身重背^{ハタ}強腹中絞痛

喉^{ノド}咽不利毒氣攻心^{セメ}下強短氣不得息^{不_レ言_レ治者_ハ大_ニ宜_ニ醫_ニ氣_ヲ等_ニ下_ニ安_ニ合_ニ方_ニキ_ル}逆脣

青面黑^{タニ}四肢厥冷其脉沉細緊數此陰毒^{カクク}僂身^{ハタ}

如被打五日可治七日不治方^{ナリ} 醫門方同之

甘草二^ハ 外麻二^{トリツマシクセ} 當歸一^{オホセ} 蜀椒一^{アサハシカア}

欬^ハ 龍^ハ 甲^ハ 四^ハ

凡五物咬咀以水五升煮^取二升半分服三行五里

復脹溫覆中毒當汗^{セリ}則愈若不汗病除

重脹^リ逆

治傷寒陽毒方第廿六

集驗方玄陽毒者或傷寒一二日便成陽毒或服藥

吐下之後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安面

赤狂言^シ或走或見鬼或下利其脉浮大數面斑

如錦喉咽^{ノド}痛下體^腰五日可治七日不治方^{醫門方周之}

甘草二分^灸當歸一分蜀椒一分^{玄目}升麻二分

雄黃二斤 桂心一斤

凡六物以水五升煮取二升半入三服行五里

須腹脹溫覆手足中毒則汗ヤ則解不解重

作セウ今世有此病此二方實未經用

治傷寒汗出後不除方第七

集驗方大汗出後脉猶洪大形如瘕日一發汗出便解方

桂心一兩十六銖 夕藥一兩生薑一兩甘草一兩

大棗十四枚 麻黃一兩 杏仁廿三枚

凡七物切以水五升先煮麻黃再沸下諸藥煎

得一升八合脹六合

治傷寒鼻衄方第廿八

千金方云傷寒鼻衄ハナチヤリ腸間有餘熱故也ナリ熱因衄自心下

者方

牡蠣十八

シカキ
左顧者

石膏五斤右二味酒脹方寸匕先食日

三四一凡衄亦可用一方以漿脹之コメツ集驗方同之

僧深方治熱病鼻衄ヤエ多者出五二三斛方

補黃カウラウ五合以水和一飲盡即愈不差別依諸衄方

又方燒牛一龔作灰脹方寸匕又方以冷水洗佳

治傷寒口干方第卅九

集驗方治傷寒熱病口干喜唾方コヲツキハク

干來棗冬枝硬アセク烏梅ホシクメ十枚碎クタク

二物合鴿蜜和含杏核大咽テ其汁ツク

治傷寒唾血方第卅

范汪方治熱病唾血方

白第根第一物鴿下篩為散方寸匕日三至可絞取汁シホリ

飲之

他古方第幾文皆寫也吐棄也

治傷寒吐方卅一

宋書卷之六

集驗方治傷寒吐虛羸欲死方

ウケノツカシ

鷄子十四枚 以水五升煮取二升乃內豉四合復煮

兩三佛去豉八再服之

治傷寒臧方第廿二

七方ノ化

病源論云傷寒所以臧者胃中虛冷故也

六月及逆氣也

化

九方

葛氏方治傷寒宛不心方

七方ノ一

甘草三兩 橘皮一升 水五升煮取一升頓服之 日三四

モ

小品方云春夏時行寒毒傷於胃冷宛方

白茅根切一升 橘皮二兩 桂心二兩 葛根二兩

茅

ク化ノ不

凡四物以水六升煮取三升分三服之

救急方玄天行後干瀉シクモシ若歲半足冷シクモシ方

橘皮四兩生薑半斤右以水七升煮取三升分四

五服立驗

治傷寒後瀉ムカク方第卅三

集驗方治傷寒後干瀉シクモシ不下食蘆根飲方

生蘆根切一升青竹茹タケノコカハ一升粳米ウツシネ三合生薑二兩切

以水七升煮取三升隨便飲不差重作

治傷寒下利方第卅四

葛氏方治熱病不解而下利困篤欲死方

大青ハトクセ四兩甘草二兩膠ニカハ二兩 豉八合

以水一斗煮取三升分三服盡更作日夜兩劑愈

又方以水煮豉一升文干十四枚葱白一杞取二升三服

治復寒飲食勞復方第卅五

病源論云夫病新差血氣虛津液未復尚目即勞動使成

病焉若言語思慮則勞於神梳頭澡洗則勞於力未堪

勞而強勞則生熱氣還入經絡復為病ナレ名曰勞復

門方云論曰凡溫病新差及重病差後百日內禁食猪肉及

腸而肥奠油膩必大下利藥所不能療也必至於死
若食餅餌クラヘ王千ヒ染黍飴脯キアシキヤハシ粘食ネキ炙肉アツク膾菰生棗栗諸菓
子及堅實難消之物胃氣尚冷大利難禁不下之必
死下之後兇不可不慎也。

病新差後但得食粥オシラ糜オシラ寧少食シヤク令飢慎勿飽食不得
輒有所食シヤク雅思之勿与ス引日轉久可漸食シヤク麋鹿雉兔肉
等為佳

療契病新差早起及多食シヤク菰復方シヤク

支子十枚水二升モ煎取一升去滓頓服之温卧令

發汗佳通除諸復

又方燒龜甲末服方寸匕 葛氏方同之

葛氏方治葛病新起早勞及飲食多致復欲死方

以水脹胡粉少許又方燒飯籬末服方寸匕

小品方治食勞復方葛根五兩以水五升煮取二升分三服

千金方治食勞方

杏人五枚 酢カラムシ二升煮取一升脹之取汗

又方燒人矢灰水脹方寸匕

治傷寒洗梳勞復方第卅六

千金方云洗手足復者飲手足汁一合梳頭復者吞頭垢如棄大者一枚
平金方治或目洗手足或流頭勞復方

取洗手足汁飲一合又方取頭垢如棄大者吞一枚

尺者一枚

腎門方云溫病差後當靜卧勿早起自梳頭澡洗但非

體勞亦不可多言語用心使患此皆令勞復

又云若欲令病不發復者燒頭垢如杏人大服之

治傷寒交接勞復方第卅七

腎門方云溫病新差未滿百日氣力未平復而已房

室無不死者

尚可女勞多死

一

二

一三一

又療丈夫本元熱病差而交接發或陰ハツ卵ツツ腫縮入腹中絞痛ツツク

欲死方

取女人月經ハツ赤衣燒末服方寸匕

又方取女人陰上毛燒飲之極救急セリミハツタケキ又

僧深方云婦人時病毒未除大夫曰幸之ハツ婦感動氣

泄毒即度著丈夫名陰易病也丈夫病毒未除婦人

納之其毒度著婦人者名為陽易病也イハル

陰易病者婦人陰毛十四枚燒服之陽易病者ナラ

燒丈夫陰毛十四枚服也ハツ

葛氏方云男女溫病老後雖數十日血脉未和尚有熱毒
与之交接即得病名曰陰易致人甚於時行宜急治之令
人身體重小腹急熱上衝胃頭重不能奉眼中生眵^{ナシ}脉
旺^{ナシ}构急欲死方

取婦人禪^{コシモキ}親陰上者割取燒末服方寸匕日三小

便即利而陰微腫者為當愈得童女禪益良若

女病取男禪如此為之^{セウ}千金方醫門方同之

千金方治交接勞方

取所与交婦人衣覆男子上一食久

^セ葛氏方醫門方同之

又方取嬰女人手足爪十枚女中衣帶一尺燒以酒炙米
汁飲之

治傷寒病後頭痛方第卅八

千金方云傷寒老後更頭痛壯熱煩悶方

服黃龍湯五合日三

集驗方同

治傷寒病後不得眠方第卅九

治本元氣虧損等症

病源論云大病之後府藏尚虛營衛未生故成於冷熱陰
氣虛衛氣獨行於陽不入於陰故不得眠若心煩而
不得眠者心熱也若但虛煩而不得眠者曠冷也

都敦及

千金方溫膽湯療大病後虛煩不得眠此膽冷故方

名

九

生薑四兩

半夏三兩

枳實二枚

橘皮三兩

甘草一兩

竹茹二兩

六味水八升

煮取二升分三服之

方中甘草方經有之等作安眠

玉箱要錄云大病後虛煩不得眠眼闇疼懊農方

為湯及

奴浩及作喘一有所根

致七合

烏梅十四枚

水四升

先煮梅取二升半

內豉煮取一升半八再服無梅用艾子十四枚

治傷寒病後汗出方第五十

病源論云大病之後復為風所乘則陽氣發泄故令

虛汗

虛汗

聖心方卷之十

五十四

一三一五

葛氏方治大病差後多虛汗及眠中汗流方

龍骨シカキ牡蠣カクネクセ麻黃根カチ梔末ツネラ雜カチ粉ツネラ以粉身

錄驗方治大病之後虛汗不可心方

干薑ツギ三分 粉ツギ三分 治合ツギ以粉大良

小品方治大病後虛汗出不禁方

柒シキ粉シキ豉シキ凡二物シキ入等火熬シキ令集燒シキ故竹扇シキ

如掌大取灰合治以絹囊盛傳體立心最驗

當先熬豉末之ヒトシク与粉等也

玉在強反
餌謂之菜
或淡食字
也稻餌也
師說粟也

又云治大病之後虛汗不可心方
方
中治本无誤冒本等育

杜仲^{八十二三}牡蠣^{ヲカキ}九二物^{能九クニガ}炙等治之向暮卧以水服

錢^{宝治本无錢同本有}午上^{ムカフチクニ}汗心者不可復服令人乾^三燥

治傷寒後目病方第五十一

葛氏方治毒病後毒攻目方^{七十九}

黃蜂巢以洗之日六七

^{今葉廣利方云蜂窠半大雨水二升云々僧深方治翳}

又方冷水漬青布以掩目^{オホハ}

^{下モウ}集驗方治翳

又云若生翳者燒敗二七枚末內管中以吹^{集驗方同之}

耆耆婆方溫病後目黃方^九

麥門冬^{ヤナハ}菜三握^{三リ}以水一升煮取三升去滓少飲

之自老

槎要方療傷寒病溫毒契病時行瘕氣諸病之後毒
充眼中生赤脉赤膜トメ白膚白翳ハシ者方悉主之有患赤
痛不得見光病毒煩惱應心者洗之即心神効之方

秦皮トネリモミ二兩 升麻トリヤシ二兩 黃連カクア二兩

右以水洗去塵屑クダケ然後以水四升煮取二升半トメ
三合トメ眼作以綿繞箸トメ沾取湯以滴眼中如屋漏狀
盡三合心須更復用如前法日五六過佳トメ

治傷寒後黃疸方第五十二

葛氏方治時行病葭黃方

苜陳蒿六兩ヒキヲミキ 大黃二兩クサカレ 支子十二枚シ 以水一斗先煮之

苜陳取五升澤去滓內二藥又煮取三升分四服之

千金方治傷寒熱出表葭黃疸方

麻黃三兩カウネクセ 以清酒五升煮得一升半盡脹之ウツライ 覆取汗オホフ

治傷寒後虛腫方第五十三

千金方治病後虛腫方

豉五升ルナル 淳酒一升ナカラフ 煮三沸及熱頓服不耐タヘ 酒隨性覆セウ

治傷寒手足腫痛欲脫方第五十四

更

二二

千金方毒熱病攻手足腫痛欲脫方

馬矢煑漬之。

又方以栢糠汝陽又木莖也

灰汁漬之

又方常思草ナモツ絞取汁以漬之

又方ナモツ削黃蘗水煑漬之

又方ナモツ削黃蘗水煑漬之

又方煑猪蹄取汁以白葱キ塩少著中イシ以漬手足冷則易

集驗方治毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方

濃煑コナ帛杖根以漬手足

又方酒煑苦參クサ漬之

治傷寒後下利方第五十五

小品方治濕熱為毒及大陽傷寒日外熱內虛熱攻腸胃

下黃赤汁及如爛肉汁及赤滯^{チクシ}壯^{チクシ}熱腸痛者諸熱毒

下良方

支子^{クキナシ}十四枚 豉^{クキ}一升 薤白^{オホアラウシロア}一席口

凡三物切以水四升煮支子薤白令熟內豉煎取

二升半入三服

經心方治熱病後赤白利^痢痛不可忍^{ツク}方

香豉^{カウクキ}一升 黃連^{カクノクモ}三兩 薤白^{ウレシホ}三兩

以秬米^{ウレシホ}汨汁^{ウレシ}五升煮取二升半入三服之

醫門方療傷寒後下利^{濃致}膿水不能食方

黃連三兩 烏梅肉二兩 ホシクマク 蟻一兩 カシ 洋蠟和蜜合

為丸空腹如梧子服卅九日再加至四五丸

又方取龍骨末服方寸匕佳

治傷寒後下部癢痛方第五十六

葛氏方治大孔中卒癢痛如鳥啄方

赤小豆一升大豆一升合搗兩囊盛蒸之令

熱牙坐上

又云治毒病下部生瘡方

教大塩イリ以深導イシヨ之不過三

又方煮桃皮アヌ煎如アヌ粉アヌ以綿ヘ合ヘ導之

范汪方治大孔中瘡方九

取女萎五ニクセ治下節綿糸裹イレヨ着大道中瘡ナ絕乃

出藥

治傷寒豌豆瘡方第五十七

病源論云夫表虛裏實アチ熱毒內盛則多發瘡重者周逆

遍身其狀如火瘡若色赤頭白者則毒輕若色紫黑ナ

則毒重其瘡形如豌豆ワシメ之名豌豆瘡ツツメ

今案千金方云小便澀有血者中壞瘡黑廔不

出膿死

千金方治豌豆瘡方

初發覺オホエ欲作則煮大黃五兩服之愈

又方取好蜜ミツ通身瘡磨上 又方以蜜煎トリクテシクセ并麻摩之

又方青木香二兩水三升煮取一升頓服同上様要方同之

又方小豆屑クタイ鷄子白和傳之ツヤウ又方婦人月布モ拭之ツコヘ

又方青木香湯方青木香二兩丁香一兩

董陸香一兩白礬石二兩射香二ハ石五味以水四

升煮取ハ半升ハ再服ハ熱毒盛者ハ加一兩犀角無犀

角升麻代病輕去燬石大神驗

葛氏方治時行蛇瘡方

以水濃煮升麻綿沾洗拭之又苦酒漬煮弥好

救急單驗方療時患遍身蛇初覺出方

即服三黃湯令利蛇即滅又方飲鐵漿升五老

又方小豆末一合和水服驗

新錄方豌豆瘡滅鹽方

鷹矢粉上若瘡干和猪脂塗日三又方胡粉付上

又方桑白汁和鷄子白塗之又方用蜜塗之

千金方芒消和猪膽塗瘡上勿動痂落無痕

都敷及

カセメカ

キハ

アト又キハ

今案天平九年六月廿六日下諸國官府云凡是疫病名赤

斑瘡初發之時既似瘡疾瘡出之間經三四日支體府

藏大契如燒當是之時欲飲冷水固忌莫飲以綿能

勒腹腰必令溫和勿使令寒又鋪設既薄无卧地上唯

於床上敷箬席得卧息又粥饘并煎餅栗等汁溫冷

任意可用又糯粳糴以湯饘食之又病愈之後雜經廿

日不得輒喫鮮菓宗菓菜并飲水及洗浴房室強行步

當風雨年更不可食但乾饒堅菓等煎杏皆良

傷寒後食禁第五十八

養生要集云凡溫病傷寒愈後但宜食糜粥唯少
勿食大飽引日轉久可轉合羊脂雉菟麋羹汁少
食之慎メ不慎病復致死

又古凡傷寒毒病愈百日之內禁食猪羊腸血肌菓臠セウ乾之難消之物不禁者則令泄利セ不可復救也テ

養性志云諸病愈後勿食五辛食之令人目失明

七卷食經云時行病愈食禁葫蘆ヲク並蝦蟇エビマ鰓ウナギ鰾タケ葷タケ不禁病復

義則難治後年輒義

時行病後禁餅餌更膳諸生菓菜難消之物皆復發病

時行汗解愈後勿飲冷水損心肥常虛不能伏フ礼

時行病人不可食鯉シヒ鮓小鯉及鮓令病不愈

又勿食生菜及羊宗隔上乃為契燔音藥釋氏云火光也

凡病人不得食熊肉令作長病終不除愈

時行後禁飲酒食生更令泄利難治以周文

時病愈後未滿三月食鮓更復食諸菜三年肌膚

不充アツ

儘直田及陸云集

或作鮓子麻云

又食梅油脂物令暴利難治セ又食菰合鮓令病復

設又食蒜鱸令人損脾胃消又未滿三月食鮠鮠即復

病時行病後未強（此カヤカフ）食青花椒令人手足損重（此云黃花）

又飲酒合陰陽復病必死又食生菜合陰陽復必死

治傷寒變成百合病方第五十九

千金方云百合病者是一百脉一宗悉致病也其狀惡寒而

歛者病在上焦也（ムカツ）其腹滿（フルシ）後喘（アキ）大便堅三四日一便

時復小溲者病在中焦（モソ）其狀小便淋瀝（シユハリ）難者病在

下焦也（音唐）各隨其證以治之耳（云々具在本方）

百合之病令人欲食復不能食或有羨時或有不用聞（カ）

此本无發自本其有

本九上七

飲及飯^ニ如^ニ有寒其實無^ニ有^ニ契其後無他常默^ニ欲^ニ

卧^ニ復不能眠至朝口苦^ニ小便赤^ニ欲行^ニ復不能行也^ニ諸藥

不治^ニ治之^ニ即^ニ劇^ニ如有神靈^ニ所為也^ニ

百^ニ合病其脉^ニ微數其候^ニ溺時^ニ即^ニ頭覺痛^ニ者^ニ六十日^ニ愈^ニ

百^ニ合病^ニ候之^ニ溺時^ニ頭不覺痛^ニ者^ニ如寒者^ニ卅日^ニ愈^ニ

百^ニ合病^ニ證或其人未病已^ニ豫見其候者^ニ或已病一月日^ニ

復見其候者^ニ治之^ニ喜誤也^ニ依證治之^ニ治百合病已^ニ發

之後者方

百^ニ合根取七枚^ニ壁之洗^ニ水二升^ニ漬之一宿^ニ當沫出^ニ水

中明且去水取百合以泉水二升煮百合取一升汁

復取知母三兩切以泉二升煮取一升汁合和百

合汁中復煮取一升半分再服不差又合如此法也

治百合病已經下之後者方

滑石三兩代赭一兩以水三升煮取一升內百合汁如前

法一升合和復煎取一升半分再服

治百合病始不經發汁不吐不下其病如初者方

生地黃汁三升和百合汁後煎取一升半分再服

便當去汗為候也治百合病已經吐之後者方百合汁一升如前法取鷄子黃一枚內汁中攪令調勻而再服

治百合病經一月不解寢如渴者方

取百合根一升水一斛漬之一宿以汁洗病人身也洗
身竟食白餅勿与塩豉也渴不羗可用栝楼根并
牡蠣分等為散飲服方寸匕日三

治百合病變發熱者方

滑石三兩 百合根一兩

右燉之飲服方寸匕日三當微利者心勿復服也

治百合病變腹中滿痛者方

但取百合根随多少熨熨令黃色飲服方寸匕日

三滿消痛也

瑞祥自作治傷寒後虛方

治時行後變成癰方第六十

錄驗方云大五補湯治時行後變成癰方

芍杞クミヲ白皮一升 麥門冬ヤブタリノ一升 去心クレフハシカラ生薑二斤 干地黄三兩

當歸オホセリ三兩 黃耆カハラセニク三兩 人參カウニトクセ三兩 甘草アデキ三兩

伏苓トツホト三兩 生竹葉キ五兩 遠志葉皮三兩 木シケフ三兩

苦薺シムナカツ二兩 桂心ホソク五兩 大麥ヲホナツメ廿枚 桔梗アツリウシツキ二兩

夕藥モルケルリ三兩 半夏ホソク二兩 洗

凡十八物切以水一斗五升煮取三升分四服一日令盡之

醫心方卷第十四

醫心方卷第十四札記

三頁上 有須 仁和尚寺及外臺作有須 四頁上 二升 仁和尚寺作一升

行六十 仁和尚寺傍記 下三 魍魎 仁和尚寺作魍魎 五頁

行四八 仁和尚寺作四兩 七頁上 以淳苦酒云 仁和尚寺作此下有又

方灸香上一 八頁上 頰脈之 仁和尚寺作此下有又方

寸七壯九字 四行 頰脈之 仁和尚寺作此下有又方

九頁下 得忤 仁和尚寺作忤 十頁下 今案 仁和尚寺作無此二字

云 仁和尚寺作無此二字 行中帶 外臺引文作中下有并字 十一頁 雜

居 仁和尚寺作居 十二頁 浸溺 病源作浸 其權 仁和尚寺作

其下有氣 十三頁 已槎 仁和尚寺作

字外臺同 上一行 已槎 仁和尚寺作

行心上腸 病源

撫作暖外

十四頁

宣散

仁和寺本散下有致陰

十六頁上

臺作暖

上九行

宣散

氣三字病源外臺同

頁上

七意至

仁和寺本作
意志外臺同

自縊

十八頁

俱佳病源

作居

身內

仁和寺本
作即病

下二

卒死

仁和寺本卒作
感生三字病源同

十九頁

方杵

仁和寺本
方作万

六頁上

大腹

仁和寺本
作腹千金作

腹

廿一頁

心主暮

仁和寺本傍記有
詹字案暮恐寡訛

九廿日

仁和寺本

作三

廿四頁

新錄方云惡症方

仁和寺本云作治此
下有炙乳下邪三寸

日中

上四行

螺塊

外臺病源
上五頁

戶經

寺本作尸

下三

十主

仁和寺本作十良案主炷之
字云字主之後草體致訛耳

心

行八三服

仁和寺本此下有又方塩墨湯
頓服又方妙火熨之十三字

下二行

注

今案

仁和寺本無此注

上廿八頁

遇時

外臺作過時

上廿八頁

之驗

仁和寺本此下有極要方療瘡無問新久服之皆愈方恒山七八橋皮三分鑿甲七分炙甘草七分

炙桂心二分松蘿二分烏肉六分炙右為散酒服方寸匕日再加至二十七五十九字無范汪方治瘡方六字

下九頁

蜀木

仁和寺本作蜀水

下二頁

脉肉

外臺作肌肉

上三頁

八令盡

仁和寺本此下有僧深方治瘡高淡不得吐之湯方桂心半兩恒山二兩烏頭半兩元花半兩

絞五分九五物以酒三升水四升令煮取二分三服得吐五十三字

下八頁

奇本無

上八頁

僧深方

仁和寺本無此方與舊校字治本合

上廿七頁

為傷

仁和寺本傷下有耳其傷三字

上六頁

苻初

仁和寺本作苻初

下九頁

死毒

仁和寺本死下有匿字

上四頁

通玄經

仁和寺本無此條與舊校字治本合

行小腸病源作下七服一二升佳仁和寺本此下有千

頭痛壯熱脈盛如得一二日方真丹一兩以世五頁水二升煮得一升頓服之覆取汗世九字上三行

八三服之仁和寺本此下有千金方治瘕氣傷寒三日

三升煮取二升分再服六當得吐之仁和寺本此下有

覆令汗神驗四十一字行當得吐之仁和寺本此下有

日旬中惡汁欲令吐方致三升強一升水七升煮取二升半去滓內蠶一升又煮三升頓服安卧當吐之世五

字五十四頁支子仁和寺本八三服之仁和寺本此

有半介搗碎以水一斗煮取五升五十三頁如此為

使極冷飲其間或得汗則愈世七字上七行

之仁和寺本此下有又方創青竹茹一斗以水二升

五十四頁

支子十四枚仁和寺本此下有又云千里流

上六行

水一石揚之萬過取二斗半夏

二雨洗糶米一升沃卷四雨合
糶得五升久五服三十六字
上二十五頁
令人乾燥

仁和尚幸此下有又云治發汗後遂漏汗不心其人惡
風小便難四支痠急難以屈伸此為胃乾也桂枝湯加

附子主之方大棗十四枚擘桂枝三兩附子一枚碎之
八片凡三物以水七升煮取三升分三服七十二字

五十六頁
濕熱仁和尚幸
作濕熱
上八行
稅米稅即統

仁和尚幸
作稅米
分三服之
仁和尚幸此下有千金方傷寒
液下利膿血方黃蘗二兩黃連

四雨支子人十四枝阿膠一兩右四味
以水五升煮取二升分三服四十三字
行下二四五凡

仁和尚幸
作
行牙坐上
仁和尚幸此下有醫門方契
病有區上下食之方猪脂一

救若眉一合右相和煎之
二三拜滿口
下八頁
出膿死仁和尚幸

有又云傷寒契毒氣盛多發死瘡色白或赤發於皮膚
頭作瘰癧戴白膿者其毒則輕有紫黑色作根隱隱在

肌肉裏其毒重則甚者五內七竅皆
有瘡亦如登豆故以名爲六十五字
六十一頁 沂

仁和尚寺奉 六十二頁 發汁仁和尚寺奉
作漸 上六行 汁作汗 上四行 黃

耆三雨 仁和寺奉
三作二

醫心方卷第十五

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

說癰疽所由第一 治癰疽未膿方第二 治癰疽有膿方第三

治癰發背方第四 治附骨疽方第五 治石癰方第六

治瘰癧方第七 治燥疽方第八 治久疽方第九

治緩疽方第十 治甲疽方第十一 治腸癰方第十二

治肺癰方第十三

說癰疽所由第一

劉涓子方云九江黃父問於岐伯曰余聞腸胃受穀

上焦出氣以溫分肉而養骨髓通腠理中焦出氣如
露上注谿谷而滲孫脉津液和調變化而赤為血、和
則孫脉先滿乃注絡脉、皆盈注乃於經脉陰陽已
張因息乃行、有經紀周有道理与天合同不得休心
切而調之從虛法去實寫則不足疾則氣留去虛補
實則有餘血氣已調形神乃持令已知血氣之平與不
平未知癰之所從生成敗之時死生之期、有遠近何
以度之可得聞乎

歧伯曰經脉單行不心與天同度與地合紀故天宿失度

日月薄蝕地經失紀水道流溢草廬不成五穀不植經

絡不通民不往來蒼聚邑居別離異處血氣モ猶然ナリ

請言其故夫血脈營衛周流不休上應星宿下應經

數寒氣客於經絡之中則血注シテ澁シ則不レ通レ則氣

歸之不得復返故癰腫焉寒氣化為契チ勝則穴

腐腐穴則為膿腐不寫則爛タシカ筋筋爛則傷骨ヤ傷則

髓消不當骨空不得泄九シ寫九シ筋枯空虛筋骨肌穴不相

親經脈敗漏內薰九シ於五藏九シ傷故死矣

又云黃父曰夫子言癰疽何以別之岐伯答曰營

秘傳

衛氣留於脉久則血淡、而不、行、則衛氣從

本言及地也也大

丁七九

、之、不通、應遏不得行、大契不心契、勝、

クマ

カニ

則寒、腐、為膿、犹不能陷、肌膚枯於骨

七

、髓、不為焦、枯五藏不為傷、故曰癰

黃父曰何謂疽、岐伯曰契氣淳盛、當其下筋

カニ

於地及屋也

骨、良寒、無餘、故命曰疽、上皮膚、以堅、上如牛

カニ

カニ

領之皮、癰者上薄、以澤、此其候也

カニ

黃父曰乃如所說、未知癰疽姓名、叢起處、所色、

訖形、俟治与不治、死活之期、願事、聞之

故伯日癰疽イハヒトモセシ曰赤疽イハヒトモセシ發頤不寫イハヒトモセシ十餘日死

其五日可刺也其膿赤多而死未有膿可治人年

廿五廿一六十九十五百神皆在頤不可見而イハヒトモセシ者死也

禽疽イハヒトモセシ發如輒者チホキル數十處其四日腫合カタナリセネム牢板痛

其狀若寧十日可刺其內發身振寒齒如噤シクシク

欲瘥イハヒトモセシ如是者十五日死也

杼疽イハヒトモセシ發項若兩耳下不寫十六日死其六日可刺其

色黑見膿而腐者死不可治人年本主書何共ニ廿十九廿三廿

五廿九五十一五十五六十一八十七九十九神在兩耳不可

見血者死

釘疽發兩肩此起行所逐惡血結留內外營衛不

通發為釘疽三日身腫痛甚口噤如瘰狀十日可刺不

治廿日死。發背起心俞若肩隅廿日不寫死其八

辨疽。

日可刺其色赤黑膿見青死不治入年六十八

廿四廿五十六十七六十二九十八神皆在肩不可見血

者死

陰疽發髀若陰股始發腰強而不能自止數飲

不能多五日堅痛如此不過三歲死

三推方而三旁各寸半
九推方而三旁各寸半

刺疽起肺俞若肝俞不寫廿日死其八日可刺發

而赤其上突如櫛子者死不可治人年一九廿五卅

三卅九五十七六十七三十八十一九十七神皆在背不可見

面々々者死

脉疽發環頭。

一方如痛身隨而熱不欲動
作頸

惛惛清也而熱不欲動惛々

於脊及腰中清滿也

或不能食此有所大畏忌蹠而不精上氣欬逆氣絕

其發引耳不可動廿日可刺八十日死

龍疽發背起胃俞若腎俞廿日不寫死九日可

刺其上赤下黑若青膿黑死發而膿者不死

胃心方各寸半

四

首疽發、契、八十日一方云八九日大契汗頭引身盡如

癰身契同、如沸者擇皮頗腫處淺刺之不刺

入腹中廿日死

俠榮疽發脇若起兩肘頭廿五日不寫死其九日可

刺發赤白間其膿多白而無赤可治也人年一十六

廿六廿二卅八五十八六十四八十九六神皆在腎不可見血

者死

行疽發如腫或復合相往来可要退其所在刺

之即愈舅疽發股起大陰若伏鼠廿五日不寫死

其十日可刺

癰疽發股清膿赤黑死白者尚可治人年十一十

壯者勞之驚也

五廿卅一卅三卅六五十九六十三七十五九十一神皆在尻

尾不可見血々々者死

標^{通達也}并^{通達也}疽發熱大同々耳聾^{こら}後六十日腫如裹水狀

如此可刺之但出水後及有血々出即除也人年五

十七六十五七十三八十一九十七神皆在背不可見血

々々者死

癰疽發足跌若足下卅日不罵死其十二日可刺

癰疽發足跌若足下卅日不罵死其十二日可刺

五

癰疽發赤白膿而不及大多其上白赤黑膿下

死不可治不黑可治入年十三廿九卅五六十

十三九十三神皆在足不可見血々者死

衝疽發少腹痛而振寒熱四日可刺五日痛六日

癰而可刺之不刺之七五十日死

敦疽發兩手五指頭若足五指頭十八日不罵死

其四日可刺其發日而黑癰不甚未過節可治也

疥疽發腋下若臂兩掌中振寒熱而蓋乾者者

飲多即歔煩心煩、或六十日乾及有合者如此

戰戰

可汗不汗入腹內死筋疽菽背俠脊兩邊
計以九
大筋其色蒼八日可刺也在有癰肥腹中九
十日死

陳乾疽菽兩臂三四日痛不可動五十日身熱
而赤六十日可刺之如刺肺無血三四日病已無膿
者死

蚤疽菽手足五指頭起過節其色不變十日之內
可刺也過時不刺後為蝕有癰在腋三歲死
九
癰疽菽身腫窄拔而身熱不可以坐不可以行不

可以^{カキテ}屈^{クフ}申^{コフ}成^セ膿^ノ刺^セ之^ヲ即^セ已^シ除^ル

白疽^{ハクジュ}發^{ハツ}脾^ヒ若^ニ肘^ニ後^ニ癰^ノ目^ニ痛^ム傷^ム精^ヲ乃^ハ身^ノ熱^シ多^ク汗^ヲ
五^ニ六^ノ處^ニ死^ス心^ノ主^ニ有^リ腫^ム癰^ノ在^リ股^ノ肱^ノ六^ニ日^ニ死^ス發^{ハツ}膿^ヲ
而^{シテ}六^ニ十^ノ日^ニ死^ス

黑疽^{クワジュ}發^{ハツ}腫^ム居^リ背^ノ大^ノ骨^ノ上^ニ八^ニ日^ニ可^ク刺^ス也^ヲ過^リ時^ヲ不^レ刺^ス
為^リ骨^ノ、疽^ノ、膿^ヲ出^ス不^レ可^ク心^ノ碎^ル骨^ノ六^ニ十^ノ日^ニ死^ス

腸^ノ少^ク陽^ノ有^リ腫^ム癰^ノ在^リ頸^ノ八^ニ日^ニ死^ス發^{ハツ}而^{シテ}膿^ヲ十^ニ日^ニ死^ス

創^ノ疽^ノ發^{ハツ}身^ノ先^ニ癢^ム後^ニ痛^ム此^ハ故^ニ傷^ム寒^ヲ、氣^ヲ入^ル藏^ノ焉^ヲ

發^{ハツ}為^リ創^ノ疽^ノ九^ニ日^ニ可^ク刺^ス不^レ刺^ス九^ニ十^ノ日^ニ死^ス

尻腰大陽脉有腫交脉屬於陽明癰在頸十日死菰膿血七十日死

尻大陽脉有腫癰在足心陽明少陽八日死菰膿血八十日死頭陽明脉有腫癰在尻六日死菰膿血六十日死

股大陽脉有腫癰在足大陽十七日死菰膿血百日死

肩大陽大陰脉有腫癰在臑八日死菰膿血四百日死

足少陽脉有腫癰在脇八日死菽膿血六百日死

手陽明脉有腫癰在腋捌一歲死菽膿血二歲死

黑疽菽腋捌死 黑疽菽耳中如米死此大疽死

黑疽菽肩不死可治 黑疽菽缺乳中名曰伏癰死不治

黑疽菽脅或本亦字可治 黑疽菽肘上下不死可治

赤疽菽陰股堅死濡可治 赤疽菽脾解樞六日可治不治出歲死

赤疽菽掌中可治 髀解際指本黑頭赤死

赤疽菽陰死不治 黑疽菽肥腸死 胞腸死

黑疽菽腓肱堅死濡可治 黑疽菽缺上堅死

瘰癧也

足下久癰色赤死不可治

又云夫癰疽者初發始發多不為急此實奇患

患惟宜速療之不苦速病成難救以此致

禍能不痛哉且述所懷以悟後賢謹條黃父癰

疽論、癰所著緩急之所死生之期如右別癰

之形色難易之療如左

發皮空淺腫高而赤即消不療先愈

發蘗空深腫下而堅其色或青黃白黑或復發

契而赤宜急療之成消中半

發附骨者或未覺內々突々已殀々々者癰疽之

甚也茲背外皮薄為癰皮堅為疽如此者多現

先非宜急療皮堅甚大者多致禍矣

太素經云黃帝曰願盡聞癰疽之形与忌日

名岐伯曰癰發於器中名曰猛疽々々不治化

為膿々不寫塞咽半日死其化為膿者寫已

々則含豕膏母冷食三日而已今案劉涓子方癰疽極者十八種云々則是也

發於頸名曰父疽其癰大以赤黑不急治則契

氣下入側腋前傷任脉内薰肝肺々々十餘

日而死矣

書學及

ヨカラ

陽氣大菽消腦面頤名曰腦鑠其色不樂頂

痛而刺以針煩心者死不治

叔劉及臂節也明堂經云一病下肘上脰因高處謂之

菽於肩及膈名曰痲癰其狀赤黑急治之此令

疾移及

人汗出至足不害五藏癰菽四五逆熯之

今案劉消子方癰四五逆

熯之此七字無

菽於掖下赤堅名曰朱疽治之用砭石欲

方虛文砭石刺病

細而長數砭之塗以承膏六日已勿累之

其癰堅而不潰者為馬刀俠嬰急治之

今案劉消子方作鼠膏

菽於胃名曰井疽其狀如大豆三四日起不早治

聖方集下之

乙

下入腹不治七日死

莢於脅名曰敗癰、者女之病也灸之其病

大癰膿治之其中乃有生肉大如赤小豆劉護

翹草根各一升水一斗六升煮之竭為三升即

強飲厚衣坐釜上令汗出至足已

莢於股脗名曰脫疽其狀不甚變而癰膿搏骨

不急治卅日死

莢於尻名曰免疽其狀赤緊大急治之不治卅日

死矣莢於股陰名曰赤施不急治六日死在兩

股之內不治六十日而死

エトクシ

菽於膝名曰疵疽其狀大癰色不變寒熱而

他レ

ア

ナラズカ

他レ

緊勿石之死湏其榮乃石之者

勿石之者准例皆死之此唯言石之或以冷石

耐之所^レ以堅而不石以其寒聚能^レ聽榮乃石也

諸癰疽之菽於節而相應者不可治也

大

菽於陽者百日死菽於陰者卅日死也

大夫陰器曰陽婦人陰器曰陰

菽於脛名曰宛齧其狀赤至骨急治不治害人

全

菽於踝名曰走緩其狀色不變數石其輸而心其

ハフシ

シヤ

寒不死

石其輸者以冷石耐其所由之輸也

一三五九

發於足上下名曰四淫其狀大癰不色變不治百

日死

足上下者足
跌上下也

發於足傍名曰厲疽其狀不大初如小指發急

治之去其黑者不消輒益不治百日死

發於足指名曰脫疽其狀赤黑死不治不赤黑不死

治之不衰急斬去之活不然則死矣

又云身有五部伏菟一

伏菟在膝上六寸起肉禁不可灸又不言
得封此要禁為第一部故生癰疽者死也

二ムヲ
部二部者端也

辨音肥柔筋一名端腸一名直腸禁不可
刺故端為要害之處生癰疽者死也

此背三

自臂月輪已上廿一椎兩箱稱背去藏府甚
近死皮肉至薄若生癰疽陷而必死也

五藏之輪四

五藏手
足廿五輪

當於輸穴生

瘰癧者死也

項五

頸之前白頸後曰項三陽督脉在項故項生瘰癧致死也

五部有瘰癧者

死

瘰癧害甚故生人要處致死

又云楊上善曰瘰癧生所由凡有四種也

喜怒無度爭氣聚生瘰一也飲食不依節度縱

情不擇寒溫為瘰二也藏陰氣虛府陽氣

實盛生瘰三也邪容於血聚而不行生瘰四也

瘰癧一也瘰之久者敗骨名疽也

又云夫積石成山積氣成癰不從天下不從地出

皆由不去脆痼故也

病源論云癰者由六府不和而生也疽者五藏

不調所生也

凡腫一寸至二寸癰也二寸至五寸癰也五寸至一尺

癰疽也一天至三天者竟體膿成九孔皆出諸

氣憤鬱不遂志欲者血氣畜積多發此疾

凡發腫高者^乳疥源淺腫下者^乳疥源深大契者易

治小契者難治

凡五月勿食不成^ル校菓及桃棗莢癰疽癰

凡人汗入^ル諸食中食之則作丁創癰癰

凡銅器蓋食汗食之令莢惡創^肉內疽

創^肉內字也

疥之患又
詩云
疥猶疥也

凡^{フナ}癰^{フナ}與^{フナ}癰^{フナ}合猪肝肺食菰疽

凡^チ醉^チ強^チ飽^チ食^チ不^チ幸^チ發^チ疽^チ

醫門方云凡癰腫發於背欲得高々即腫浮淺
在外縱結膿者^{ムナレトモ}二多老腫不高沉在肉裏者其
腫深膿潰向內必死

范汪方云經言五藏不調致疽六府不和生癰疽

急者^{ナレ}有十一日^急刺^急疽者急二三日^急致^急人^急緩者十餘

日二日^急癰^急疽^急急者十餘日^急致^急人^急緩者一月三日^急緩

疽^急急者一年^急致^急人^急緩者數年四日^急水^急疽^急所^急發^急多

在手足數年猶可治疽者有數十種要如此

臍之疾所發緩地九不致入所發若在嶮地宜

令即消若至トモ小膿猶可治至大膿者致禍矣

一為脰乃道又戶在玉枕下一寸二為舌本三為懸癰四

為頸節五為胡脉六為五藏俞七為五繫八為

兩乳九為心鳩尾十為兩手臑際十一為腸屈之

間十二為小道之後十三為九孔十四為兩脇腹十

五為神主之舍或本九字以下并十二字无凡卅五處不可傷而况於臍乎若

臍發此地遇良醫能令不及大膿者可救至

大膿者害及矣

瘻疽脉洪

皮膚有瘻也

難治

脉炭滿者

九

易愈諸浮數之

脉應

九

當發熱而反惡寒瘻也

瘻起於節解過遇頑腎不能即消令至大膿者

豈膏藥可得生復

治瘻疽未膿方第二

醫門方云扁鵲曰瘻腫癰疽風腫惡毒腫等

當其頸上灸之數千

七

壯無不老者四畔灸三二

百壯此是醫家秘法小者灸五六處大者灸七八處

療癰疽腫一二日未成膿取伏龍肝下篩醋和凡

如泥塗爛布上帖いんご腫燥即易無不消イラ
今案葛氏方和
鷄子中黃塗

劉涓子方云癰疽之甚未發之兆飢渴為始々

發之始或發白疽似若小瘡カタ子或復大痛皆是發

候宜善察之欲知是非重案其處是便隱痛復イタミ

案四邊比方得失セヨ審定之後即灸第一便灸其

上二三百炷又灸四邊一二百炷少者灸四邊中者灸

六處大者灸八處ハ炷數處所不患多也灸應即

帖即薄令得即消內服補暖湯散不已服冷導湯或生薑

外即於薄不已用熱薄怙之法當開其口

泄熱氣也

治癰疽始作腫不赤而熱長甚速非薄怙所

制犀角榆湯方

犀角三兩 大黃三兩 升麻三兩 黃芩三兩 炙子

三兩 黃連三兩 甘草三兩

右七物切以水一斗二升煮取六升使極冷以故

練而重入湯中榆腫處小燂易恒令濕一日

一夜數百過

治癰腫黃耆^{カハシモ、ケ}治癰腫瘰癧及欲^{オムナカス}該背覺^{オホセ}痛方

黃耆一兩^{ヒニキ}黃芩一兩^{オムナカス}芍藥一兩^{オホセ}當歸一兩^{オホセ}黃連一兩

白^{ヤナカミ}薇一兩^{エヒクハル}夕^{ハナカス}藥一兩^{ハナカス}防風一兩

石八物^{フシキ}搗下篩以^{フシキ}鷄子白和塗故布上以^{フシキ}括腫

上^{フシキ}煖復易患^{フシキ}契者加白薇患痛者加當歸

各一兩

千金方^{フシキ}云凡癰疽始發或似小瘡或復大痛或

復小痛或發米粒大白^{フシキ}膿子此皆^{フシキ}瘰癧宜善察之

見有少異即須大驚^{フシキ}忙急治之及^{フシキ}新口味速^{フシキ}服諸

湯下去熱毒若無管藥即灸當頭百主其大重
者灸四面及頭二三百壯元數不必多也復薄冷藥
貼種レ救癰必差速也三當頭以大針レ入四入即
差

凡諸異腫種レ不同者五無問久近皆服五香湯刺

去面小豆薄三之三其間數レ以針刺去面若失治已潰二

爛者二猶服五香及漏蘆湯下之二以升麻湯榆洗

之二尉升麻膏若生息二完者白蘆茹散付之青里

完去盡即傳之好肉生付升麻膏肌不生付一物

醫心方卷十五

十五

黃耆散若付白蘭茹青黑惡突不盡者可以凍

子アセア

頭蘭茹半錢和三錢白蘭茹散稍付

今案五香湯在
丁腫方漏蘆湯

升麻湯升麻膏在治丹之方
黃耆散蘭茹散在緩疽之方

内消散凡是癰疽皆宜服之方

赤小豆一升

漿肉酢中
注還七匹

人參二兩

甘草二兩

瞿麥二兩

ヤ丁カ、ア

白發三兩

當歸二兩

黃芩二兩

豬苓二兩

防風一兩

カハラセ、介

黃耆三兩

薏苡仁三兩

外麻四兩

十二味酒服方寸匕日三夜二長服取差

今案廣濟方
同之但范注

汪方云内消散治膺腫不潰白芷十八白朮十八芍藥十八
十八枳實七合干薑七合當歸七合茵陳七合凡八物治合以酒服五

分七日再又令李方內消散治癰腫不潰方用白芷十八分芍藥十
分蜀椒七合並消十八分芎藭十八分當歸七分干薑七分七物下莖酒
服五八二日二一
方有白薇一分

治癰腫痛煩困方

生楸葉十重拈之以布帛裹緩勿令急日二易止

痛消腫食膿勝於衆枯冬以先于者臨時塩湯

洗潤用之 葛氏方劉侑子方同之

廣洛方犀角丸治一切毒腫癰乳發背脹之止痛化

膿為水遂大小便出神効方

犀角十二分 外麻一兩 大黃五分 黃芩五分 防風一

オホセリ

カハセリ

タチナシ

ウシタシ

カクダシ

カクダシ

カクダシ

兩當歸一カハセリ 黃耆タチナシ 交子ウシタシ 乾薑カクダシ 薑連カクダシ 人參カクダシ

甘草各一兩半 已豆廿三枚

玄心皮炙

凡十三物治下半 節以蜜和凡如梧子大空腹以飲

服十九丸取二三行快利常服為忌生葉禁 散痢ユシヨクセ 酢蒜ユシヨクセ 海藻ユシヨクセ

猪肉笋

黏食

ナリ

効驗方治卒癰腫白蓋ナリ 怡方

大黃三五九ク丸 分 黃芩三五九ク丸 分 芍藥二五九ク丸 分 白蓋三五九ク丸 分 赤石

脂一五九ク丸 分

凡五物治合下五九ク丸 節以鷄子白和如泥塗紙以薄

五九ク丸

腫上燎易之

錄驗方治癰腫運赤痛及已潰松脂^{タル}怗方

成煉松脂^{セル}一斤^{シカアツキナニ}螻蛄^{キハタ}半斤猪脂四斤當歸

二兩黃連一兩黃蘗一兩

凡六物^{ウチクタイ}吹咀三物盡合煎三沸三下俟^{ウカ}怗色

變微紫色^{ルユシ}者藥成絞去滓若初腫未有^ラ

膿者塗紙怗^{ハケヨ}腫上日三易夜再若以潰

有口者穿^ウ紙出瘡口怗四邊令膿聚

不食傍宗速差今案諸方松脂^{今案此下ニハ注也}怗

已多但劉涓子方松脂二斤黃連一兩

附子^{ニシテイシ}雨黃芩一兩夕藥一兩細辛一兩

石膏二兩也又効驗方杏仁一兩臈蜜一兩

松脂一兩厚朴一兩也

千瘡萬病霜膏治金木創癰疽諸惡創若

始得癰痔腫上五百過即消若以潰者^{タラ}著瘡中

食膿^ケ去其在本方小品方云經言寒氣客於

經絡之中則血氣^{シテリシアリ}澁^{ニモアリ}不行壅結則為癰疽也

不言契之所作其成癰久寒化為契^{トモアリ}盛則実

腐爛ナル為膿也依經証復之由人ニ體中有熱被

寒冷博搏之血脉澀澀不行熱氣擁結フモカリ則為癰疽

也是以治癰疽方有灸法者治其始ト中寒トコハヤシ

未成熱之時也其用於薄指者治其熱已成以消

熱使不成膿也今人多不悟其始不用溫治及灸ヒトラ

法也今出要方以治其成形者耳赤色腫有尖頭者トカレル

根廣一寸タリ還名為癰其廣一寸以上者便為小癰ニミカク

也其如豆粒大為疣ニキア

治作癰令消方ナル

醫心方卷之五

ト

取廉角就磨刀石上水摩之トク以汁塗燂復塗

則消也ナカラ內宜服連翹湯下

又方生春小豆下篩鷄子白モ和如泥塗之

治始作癰疔赤熱痛方

單燒廉角作末礼苦酒和薄之ヨ乾復塗之自

消又方單搗大黃未テ苦酒和薄之セ溫則易

治癰及癰始結腫赤熱方

水摩半夏ホソクミ夏塗之ホソクミ燂更塗得シハ一便消也

山草中自可ヘシ搗取生半夏ヲ乃佳神驗

葛氏方治諸癰疽發背及乳房初起ホトホリ所赤急
痛不早治數人使速消方

但灸其上百炷

又方釜底土搗以鷄子中黃和塗之

又方鵠コウ行根根薄之

又方鵠黃加良辛之乃平蘗下ナハシ節以鷄子白和厚塗于腹

易立愈

治癰發背腹陰處通身有數十方

取干牛矢燒七鵠細重絹七篩下以鷄子白和塗

干浸易秘方

范任方治癰腫初腫痛急方

以冷鐵熨溫輒易

又方取柴炭令心黑未作屑以鷄子白和之

以塗練上傳腫上小穿練上作小口以泄氣癰

毒便消當數易之此藥神秘方

及乳旁初起疥赤患痛使速消
尔雅云塗襌也和名文義乃毛知

本草拾遺云水蛭人患赤白遊癰及癰腫毒腫取

十餘枚令啗病處取人皮敲肉白無不差者冬月無

經汪中樞取暖湯令動先洗人皮シハナキ臍以竹筒盛イシ經スハカ

之須更咬シフ血滿ミ自腕オハ更用タ飢者今案經心方云以水經食去惡血

僧深方治癰方

梁上塵燒ヤヒ葵末ヤヒ等苦酒和傳之燦復傳治

乳癰三愈

治癰疽有膿方第三

病源論云凡癰若按之シル都牢カタナキ斬者未有膿也按

之半軟者有膿也又以手掩オホフ腫上不契者無膿若ウツレル

契甚者為有膿凡覺有膿急宜破之不尔侵食急筋骨

劉涓子云癰大堅者未有膿半堅半薄半有膿
當上薄者都有膿便可破之之法應在下逆上
破之令膿易出用針針膿深難見上完厚而生內
大針若外不別有膿可當其上數案之內便隱痛
者案映堅者未有膿也案更不痛於前者內膿已
熟也膿泄去熱氣不尔長連則不良

癰審知有膿者案之處陷不復者無膿案之即復
者有膿初腫大案乃痛者病深小案便痛者病淺也
凡破癰之後病人便綿懈欲死使內寒熱腫自有似

癰而非者當以手按腫上無所連是風毒可勿針可
脹外麻湯外麻膏破癰口當令下流三入近下一入
令針極熱ニ便不痛

夫癰壞後有惡寒者當以猪蹄湯洗去其穢次傅食
肉膏散惡寒盡乃傅生肉膏散乃摩四邊令善寒
速生當絕房室慎風冷勿自勞動須筋脉復常乃
可自勞耳不尔新寒易傷ニ則重發慎之

治癰疽洗瘡猪蹄湯方

猪蹄一具黃連五兩芍藥ヲムナカハシテ三兩當歸三兩甘草

三兩 夕藥三兩 牆藂ハハラス一斤 又方代大黃三兩

石七物以水二斗煮歸取一斗內諸藥復煮取四斗

洗之

治癰疽食惡冥蘆茹散方

蘆茹一兩 沫頭 樊石二ナレ八 雄黃二キニ八 流黃二ユラア八

石四物下篩著免頭カハハリヤシ內創口中 今案錄驗方雄黃一兩樊石一兩蘆茹一兩也

治癰疽發背已潰未潰生冥排膿散方

當歸二兩 桂心二兩 人參二兩 芍藥一兩 厚朴一兩 オキ

防風一兩 甘草一兩 白芷一兩 ヨロビヤシ 桔梗一兩

石九物楊下節溫酒服方寸匕日三夜再創未合可

長服之

今案僧深方治癰腫自潰長安排膿蜀枳散方蜀枳桂心甘草干薑芎藭當歸各一兩凡六物服法如上又

方治癰腫排膿散方黃耆四兩夕藥二兩白銀二兩芎藭二兩赤小豆一八凡五物治下服如上

治癰疽食惡寒膏方

シカアウヤニ 松脂五兩 キニ 雄黃二兩 雌黃二兩 治葛皮一兩 洩頭

チアセ三

蘆茹三兩 巴豆百枚 猪膏一升

右七物煎松脂消下諸藥炭火上煎三上三下

膏成絞去滓著兌頭內創中曰六七食惡寒初

用病當更腫赤但用如節度惡寒盡心勿使

過也

治癰疽發背已潰生^{タル}宗膏方

甘草二兩 當歸二兩 白芷二兩 烏^{オウ}豕六枚 宗^{オウ}縱

容二兩 蜀^{ナルハレカミ}椒二兩 蛇^{ニハツメ}銜一兩 細^{ミラツチナク}辛二兩 薤白二兩 干地

黃二兩

右十物切以好酒半升和漬^ル并宿以不中水猪

肪^{アフラ}三斤 煎^テ下^テ餘^ヲ心復^{アタ}三上三下膏^{スル}成^ス急

手^レ絞^{ホシ}之^ヲ今^{キミ}素^ス錄^ル駢^{ヘン}方治癰疽生^ニ突^{ツキ}膏方^ヲ薤^ニ草^ニ二兩^ニ生^ニ地^ニ

黃^{オウ}五兩^ニ當^ニ歸^ニ二兩^ニ續^ニ斷^ニ一兩^ニ黃^{オウ}芩^ニ二兩^ニ白^ニ芷^ニ三兩^ニ甘

草^ニ二兩^ニ薤^ニ白^ニ二兩^ニ猪^ニ膏^ニ一升^ニ大^ニ黃^ニ四兩^ニ
凡^ニ十^ニ物^ニ吹^ニ咀^ニ煎^ニ三上三下膏^ニ成^ニ傳^ニ之^ニ

治^ニ癰疽^{タテマシ}疔^{タテマシ}癰洗^{タテマシ}大黃湯方

大黃二兩 黃芩一兩 白^{ヒツキ}薇^{ヒツキ}一兩

右三物合^{トス}搗下^{トス}篩以水一升二合煮一沸絞去滓
適^{トス}冷^{トス}暖^{トス}以洗瘡日十過

范汪方治癰創^{ハツ}契已退膿血不^{ハツ}心瘡中空虛
疼痛排膿內塞散方

散方

此散方藥一種
尚治^{ハツ}次又五字誤

防風一兩 伏苓^{ハツ}一兩 白^{ハツ}芷^{ハツ}一兩 桔梗一兩 遠志

一兩 甘草一兩 桂心二兩 人參一兩 芍藥一兩

此散方藥一種
尚治^{ハツ}次又五字誤

此散方藥一種

十三

當歸一兩 附子二枚炮イリフ 厚朴二兩 龍骨一兩

。黃耆一兩 赤小豆五合 葵イ 凡十五物治下節溫酒脹

方寸匕日三夜一

并注血字此本无穀自字其有之
汗金方同之有
下發替茶

カハレ

集驗方治癰瘡膿血不心瘡中空虛疼痛排膿

内補散方

防風一兩 遠志一兩 當歸二兩 黃耆一兩 白芷

カハラモハレ

ヒビクモ

一兩 甘草一兩 桔梗一兩 通草一兩 厚朴二兩

アヘヒカハラ

人參一兩 桂心一兩 附子一兩 赤小豆五合 葵イ 凡十五物治合節未食溫酒脹方寸匕日三夜

シシカハラ

伏苓一兩

凡十五物治合節未食溫酒脹方寸匕日三夜

一 此方治下元不足
今案廣濟
方同之

令李方治癰內補排膿散方

黃耆二兩 當歸二兩 赤小豆廿枚 芎藭一兩

夕藥二兩 大黃一兩

凡六物治合下節以粥清服方寸匕日三

此方治下元不足
又古治癰腫桂心散方

黃耆六分 夕藥四分 桂心一分

凡三物治下獲酒服方寸匕日三

錄驗方洗癰疽并惡創毒氣猪蹄湯方

當歸四兩 甘草四兩 茶 夕藥五兩 芎藭二兩

白芷四兩 茵草二兩 黃芩四兩 獐牙四兩 猪一具

薤白根一兩 大黃四兩

凡十一物先以水二升半別煮猪蹄取一升半去

蹄肉諸藥煮得再沸下來灰汁一升又煮取

一升半湯成稍以洗創瘻結_{ナラ}疽初腫時去_{ナラ}根

牙內灰汁瘻既潰用根牙除灰汁

僧深方治癰疽瘻鼻爛洗瘻青木香湯方青

青木香一兩 夕藥一兩 白_{ナラ}殿一兩 芎藭一兩

凡四物水四升煮取二升去滓溫洗瘡日三
明日以膏內瘡中曰三

醫門方瘡癰腫已膿懼針令膿自出方

右取廬角刮取細末和醋聚安腫上經宿

膿自出若膿深者先爵半粟薄之撮膿向

土極妙

瘰癧腫不消已有膿不能針自令穿潰方

空腹脹葵子一枚一宿即穿出膿神妙

葛氏方治癰已有膿當使速潰壞方

崔氏以苦酒シ和塗上如小豆ル 又方吞薏苡子苡一枚

勿多

新修本草云癰膿使速潰方

吞薏苡薏苡一名羊薏苡一枚破癰腫

蘇敬本草注云吞惡實一枚必癰疽頭

千金方治癰潰後瘡不合方

燒鬚皮一枚作灰ハナミ封孔中 又方塗牛干易矢

又方燒破蒲席灰和猪脂內孔中ツルキカマモ

救急單驗方療頭癰目即骨陷方ハチー或本元 陷子監及墜入地也深也

先燒杏人令黑磨塗後取棗木紫葛蔓及
乾真燒灰和薑黃臍月猪脂塗神驗

治癰發背方第四

病源論云癰發背者多發於諸府俞也六府不和
則生癰諸府俞皆在背其血氣結絡於身六府氣
不和湊理虛者經絡為寒所客折於血則癰不通
故結成癰發其俞也熱氣加於血則肉血敗化而為
膿癰初結之狀腫而皮薄以澤背上忽有赤腫而
頭白搖之連根入應骨裏動是癰也發背若炙手

不可得近者內先脹平不啻行散外摩發背膏

大黃怡若在背生破イカサ無苦良不得膿以食肉膏散

著カミハリハシ兎頭內癰口中入體熱氣歇サマ脹水散五日後

癰欲差者脹排膿內塞散之

千金方云論諸日凡發背由脹皆五石寒食更生散所

致亦有單脹鍾乳而發者又有生平不服石而

自發者此是上世有脹之者

其假孽多於背兩甲間起初如粟米大オホムコ或痒仍七 蚊痛 カサカサ 此六子

作赤色人皆初不以為事日漸長大不過十日遂

至不收其臨困時方圓徑三四寸瘡有數十孔以
半索之諸孔之中膿皆乃出尋即失音不言

所以養生者小覓背上痛痒有異即取淨水和水和

作泥捻作餅子徑一寸半厚二分以薦艾作炷灸炷上灸

之一炷一易餅子若粟米大時可灸七餅即老若如榆

英大灸七炷即老若至錢許大日夜灸不住乃老

并脹五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈

又恒冷水射之漬冷石熨之日夜勿止待老住手

此病忌麵酒寒五辛等

凡腫起於背脾中頭白如棗栗四邊相連腫赤
脾里令人悶乱者名發背不灸治即入内灸當針創
 上七八百壯

又方飲鐵漿三升下利為度又方鹿角灰酢和

塗之

排膿内塞散至大瘡熱已退膿血不止瘡中突虛

瘡痛方

防風一兩ニニカ子 伏苓一兩トクモト 白芷一兩チロコクモ 桔梗一兩アリヲヒヤヤ 遠志一兩
 甘草一兩アトキ 桂心二分カウニホリモ 人參一兩シメカハツ 芍薬一兩オホセリ 當歸一兩

龍骨リウコウ二兩ニリウ

附子オウ二枚 厚朴コウハク二兩 黃耆オウ一兩 赤小豆アカアヅキ五合 熨

十五味為散酒服方寸匕日三夜一

今案范汪方云非酒則藥勢不宜

廣洛方療腫乳及五石等莖背毒熨方

黃芩ヒヨウキン三兩 白鴨屎ヒヨウシ五合 白蔞ハクカ一握 香豉カウシ五合

切水六升煮取二升分溫三服

經心方療發背方

以冷石熨腫上驗 又方馬糞付于易之婦人

發乳之老

范汪方治發背及諸癰腫已潰未潰方

搏鼓小和水令如強泥作餅餅可腫大厚三ハカ所若

有創孔空遺之勿震令汁出得以艾羅灸鼓

鼓上使溫之氣下徹鼓欲燥若熱則易令

大熱剝爛皮也癰痛尋當轉減使得安為灸

或有一日二日三日創孔中當汁出ハカ同ハカ金方ハカ

治癰腫王不流行散方

王不流行二升ハカ甘草五兩治葛二兩桂心四兩

當歸四兩九五物治合下莖以酒脹方寸日三夜一

葛氏方治癰鼓背腹陰處遍身有數十方

取干牛一矢燒搗細重銷モ篩下以鷄子白和

以塗之干復易秘方劉涓子方同之以下六字與三治本在藥筒本中

又方用鹿角桂心鷄矢、當別燒合之搗以

鷄子白和塗之秘方

又方生枯樓根細搗以苦酒和塗上干復

易之 又方赤小豆塗之良

劉涓子治癰發背發房初起赤方

其上赤處灸百壯

又方搗貯根少水トイ解以薄上ハナラ

又方竈黃土鷄子白和塗上

又方樹上不落桃子未以好苦酒和傳上良

又云欲使速潰方 水研半夏鷄子白和塗之亦能令

消

治附骨疽方第五

病源論云附骨疽者由體熱當風入骨解風与

熱相搏復遇涼濕或秋夏露卧為冷濕所折風

熱伏結壅遏附骨成疽喜大節解間丈夫及

產婦女人喜著髀膝額頤脰膝間嬰孩嫩兒

十臣抄卷一

肩平也

著轉肘背也其大老子著急者則先覺痛不得

轉動按之應骨痛經日使覺皮肉按急洪、如肥

狀則是也其小兒不知字名抱之裁近其身便啼

愛則是支節有痛處便是其候也大老子著緩

者則先覺如肥洪、耳經日便覺痺痛不隨也其

小兒則覺四支偏有不動搖者如不隨狀者之

節解中則有肥洪、處其若不知是附骨疽乃

至令身成膿不潰至死皆舉體變青黯也其

其大老子、有不別是附骨疽呼急者為賊

風其緩者謂為風腫而已皆不悟是疽乃至於死

小品方云附骨疽一名滄疽以其無頭附骨成

膿故也又名癰疽以其廣大竟體有膿故也

附骨急疽與賊風實相似也其附骨疽者由

人體盛有熱久當風冷入骨解中風與熱

相搏其始候為欲眠沉重_{言忽恍也}耳急者熱多

風少緩者風多熱少也賊風者其人體平無熱

中暴風冷則骨解深痛附骨疽久者則腫見

結膿賊風久則枯^{ヤル}瘡或結癰^{ケヒコ}瘰以此為異也是附

骨疽^{カラ}而作賊風治則益其病深膿多也是賊風^{カラ}

而作附骨疽治則加其冷風增遂成癰瘰偏枯^チ

寧曲之疾也^{力事又治也拘也}

附骨急疽者其痛處必熱體中下寒^{アル}下熱^{寒熱也}

惡寒不用熱小便或赤大便或難無汗也即

得治^チ下去熱使得消也縱不消盡亦得浮^{トモ}

淺近外易壞潰其不復附骨也賊風之證^得但^{シルシ}

痛應骨不可按^{ユタヘ}按^{ツレ}痛處不熱^{シセフ}熱體不下寒^{仁本書無此字}

乍契但覺體瘰以冷斫得契々熨痛處即小

寛時有汗也即得針灸熨脹治風温藥使

効也初得附骨疽即脹漏蘆湯下之傳小豆

薄得消也下利々已虛而腫處未消者可除

大黃用生地黃及干地黄也契漸退餘風未歇

者可服五香連翹湯除大黃也餘契未消可傳

升麻膏佳若失時不消成膿者用火針膏散

如治癰法也今案漏蘆湯升麻膏在第十七卷治之方五香連翹湯在第十六卷治惡核腫方皆出小品方

千金方云假附骨与賊風為異者附骨之始未腫

但痛而已其賊風之痛不契附骨則其上牡契
凡初得附骨疽即須急脹漏蘆湯下之付小豆
散得消可服五香連翹湯

治骨疽方

又方末蕪菁子ナツキ付帛キヌ裹メ一日一易ヒシケ

葛氏方治久疽骨疽以積年一合一莖汁出不差

方火烱トイ飴以灌瘡中曰三

又方以白楊葉ヤナキ屑傳之

治石癰方第六

病源論云石癰者^ニ是寒氣容於肌肉折於氣血

結聚所成其腫結^{カタイ}確^{カタシ}實至^{カタシ}牢有根^{カタシ}板^{カタシ}皮^{カタシ}板^{カタシ}相親

不甚^{カタシ}熱^{カタシ}微^{カタシ}痛^{カタシ}熱時自歇^{カタシ}此寒多^{カタシ}熱少^{カタシ}斬^{カタシ}如石故謂

之石癰也^{カタシ}久^{カタシ}熱氣^{カタシ}垂^{カタシ}之^{カタシ}乃有膿^{カタシ}

小品方云有石^{イフ}癰者始^{イフ}微^{イフ}堅皮^{イフ}脈^{イフ}相親^{イフ}著^{イフ}不赤

頭^ル不甚^{トカラ}尖^{トカラ}微^{トカラ}熱^{トカラ}漸^{トカラ}自歇^{トカラ}便^{トカラ}極^{トカラ}堅^{トカラ}如石故謂石

癰難消又不自^ル熱^ル皆^ル可^ル百^ル日^ル中^ル也

初^ル作^ル便^ル脹^ル防^ル已^ル連^ル翹^ル湯^ル白^ル針^ル氣^ル罵^ル之^ル傳^ル練^ル石

薄^ル積^ル日^ル可^ル消^ル若^ル失^ル時^ル不^ル得^ル治^ル不^ル可^ル消^ル已^ル有^ル膿^ル者

忽用此薄則連潰膿淺易為火針諸癰潰
後用膏散依治緩疽法初作即以小豆薄塗
之必消也

治癰結腫堅如石或如大板色不變或作石癰不
消者方

廉角八兩燒作灰白薇二兩廉理黃色可作磨

石行一斤燒石極令赤內五升苦酒中復燒

竟復更內苦酒中令減半止搗石作末并

廉角屑白薇餘苦酒和如泥厚塗臍上

裁乾更塗取消也

千金方治石癰堅如石不作膿者方

生章陸根鳩付之イホロ燄則易又治漏癰同之

又方酢和菰藎子未付根之得セ

凡發腫至堅而有根者曰石癰

又方當上灸百壯石子當出

又方梁上塵葵莖灰ヤシ入等酢和塗

又方蜀黍根白皮陰干鳩未消イホ以酒和黍

皮付上付上即拔出

治瘰癧方第七

病源論云瘰癧者由風濕冷氣搏於面結聚所成也腫結如梅李也

養生方云人汗入諸食中食之作癰瘰

又云五月勿食不成飯菓及桃李發瘰之

大素經云汗出見濕乃生瘰疽注云瘰癧之類然小也俗謂之瘰子

小品方治癰及瘰始結腫赤熱者

水摩半夏塗之煖更塗得膿使消也山草

中自可抵取生半復乃佳神驗

千金方治癰子方

凡癰無頭者吞葵子一枚多服頭多北又方生刺之心

徐伯方治癰癰方

搗商陸根和糟薄之十

又方搗百合根薄之食之十得蒸

又方搗苦苣菜薄上又生十倉食苦苣

徐伯方云搗商陸根和糟薄之十又方搗生牛膝根

薄之

范注方云癰癤初生即灸其頭數百壯即愈
又云癰癤初生尚歲者取如鷄子所石若凡十餘枚
燒以布帛裹熨之重安令極熱、歲者輒易二
三十枚則消

荆繁論云治癰癤方

鳩生^シ紆根^シ以薄腫上乃止

救急單驗方療初患似節後破無痂疼痛不可

忍名^{タフ}睹^{此字又与猪同}豕瘡方^井燒^付猪鼻作灰^付杓^付立差

陶景本草注伏龍肝鳩節合葫塗甚効

醫心方卷十五

廿五

劉涓子方治癰癰虛腫方

當歸二兩 茵草二兩 赤石脂二兩 升麻四兩

白銀四兩 芎藭四兩 大蘇^黄四兩 干玄參三兩

右八物下篩鷄子白和如^漆故布上隨腫所大

小作^レ帖^レ 燔復易之

治燥疽方第八

病源論云燥疽之狀肉生小^{ツツ}點^{シタル}點小者如粟豆大者

如梅李或赤或黑下青下白有^{ツツ}實^{ハシメ}核^{イタシ}慘^{イタシ}痛應心

或者身體其著手指者似代指^{ツツ}入不別者呼為

代指不急治毒逐脉上入藏則致人南方得此疾

皆斬去指忌其毒上攻藏故也

又云十指端忽坐榮榮痛入心不可忍向明望之晃

黃赤或黯鳥藏及青黑也青黑是燥疽直斬後節十有一並

又云風癰痛不可忍者燥疽也

疽發五藏愈節解相應通洞トモル燥疽也諸是燥

疽皆死又齒間臭熱而不心燥疽也七日死治所

所不差以灰オモヘ燄覆其而不示著人

又云諸是燥疽皆唯痛取利十有一活身此皆寒

毒之氣容於經絡氣血否_{フモカリシアリ}毒變所生

小品方云臃疽者肉中忽生一贅子如豆粒小者如米

粒粟劇者如梅李大或赤或黑或青或白其豎狀

實_臃腫有根而不浮腫也痛癢應心其根極深達

肉肌也小久不治使四面悉腫_{ツタ}癰疽黯紫黑色能爛

壞筋骨也毒流散逐脉走入藏府則致人南方

人名為榆_ヤ着毒得着厚肉處皆即割去之_{キリハス}二燒鐵

令赤燥_ヤ疣上令_{コカセ}燻如炭二灸黯_ヤ疣上百炷為佳

單春_{和名文}酸_{ルシ}蓼_{ルシ}葉薄其四面以防其長也飲葵根

臃_{五古来又}
今_{今来是}
當_當
秋_秋

竹瀝汁

八

ナシ

癰

未

學ハラメ

已上千金方同之

所

力氣アリ

カネタテ

三
せり

毛

治燥疽著手足肩背累々如米起色白刮之汁出愈

ハミナリ
良傷也

カケル
瘡也

復發方

發方

カハシセ、ハナ

ヤブ、キ

トカヲアシタモ

黃耆六分

款冬花二分

升麻四分

赤小豆一分

オウ

タラシ

附子一分

苦參一分

六味下篩酒服半錢上漸々增至一錢日三

又方煑蕪菁子イリナクム炙ナカハラ鴛帛キヌ裹丁口ハセ轉其上勿止

寒化シ

又方煑麻子末摩上日五

又方鄒栗フナ

三寸長者

乱髮オナ

如鷄子ハカリ

大猪脂二分

モ

煎塗

之

錄驗方治燥疽方

燒鐵令赤燥之ヤナ

又方蛭啗尤佳ヒルカヘ

又方飲葵根汁アホヒ

又方飲藍青汁

又方飲犀角汁

又方飲黃龍湯

龍門方治癰疽徹骨痛方トホナ

取狗糞當戶根前燒作灰塗之燒時勿令患イヌ

人知驗アホヒ

治文疽方第九

醫心方卷十五

十八

病源論云凡疽發諸節解及府藏之俞則卒急也其
久疽者發身解開處故經久積年致膿汁不盡則磨
内生虫而變成癰

范注方治久疽衆醫所不能治方

沸醢灌創中三灌即愈ホカイアキ 葛氏方同之

治久疽惡創連年不老方

黃連カウアキ二分 赤小豆二分 附子半ナシ分 炮

凡三物各搗為屑ナシ合藥之若創有汁ナシ以屑傳之無
汁皆以猪膏和屑銅器中火土使一沸以傳之

千金方治久疽方

取雞卵破其腹勿損腸胃內上白塩末以針縫合

於銅器中火煎令干未着創中無膿者以猪脂和

付小疼痛勿恠也

令李方治久癰疽漏夕藥散方

夕藥三升 大黃三升 白銀三升 莽草二升

凡四物治合下莖和調之以酒服半錢上日二不

知可稍增至方寸匕

治緩疽方第十

聖方

廿乙

病源論云緩疽者由寒氣客於經絡致榮衛湮滯氣

血壅結所成其寒氣盛者則腫結痛深而回々無頭

胡瑗又曰此也前又曰轉也

傳曰謂取瘰癧也

冰之氣膺

說文水堅也

尾大者如拳小者如桃李氷々与皮肉相親著熱氣少
其腫与肉色相似不甚赤積日不潰之乃變紫點也而皮
尾大者如肉俱爛如牛領創漸至通體青黯不作頭穿
腫或赤
潰膿者是也以其結膿積久而其肉腐壞遲故名緩疽

又名肉色疽也

小品方治緩疽方

初作宜脹七五香連翹湯七鑱去面以小豆薄塗之其間

數以鑱針去面又薄之取消良也不消色未變

針名也

青黥者以煉石薄之 若失時不得消已爛者タラ猶
服五香連翹湯及漏蘆湯下之隨熱多少投方スルハ
也外以升麻湯ヒツシ滌之傳升麻膏若生鳧惡肉者
可以單行一物白蔞茹散傳之青黑肉去盡便傳也メソ
好肉ナリ熟生但傳升麻膏良矣不生傳單行一物
黃耆散也若傳白蔞茹散積日青黑惡肉不盡者
可以凍頭赤皮蔞茹散取半錢上和雜アハセカテ三大錢上白
蔞茹散中合治之稍以傳之惡肉去盡還アハセ淳用白蔞
茹散也視好肉欲生可傳黃耆散也モハシ

白蘭茹散 凍頭蘭茹散 黃耆散

右三方並一物三ナ單行隨多少春下篩用耳

治甲疽方第十一

病源論云甲疽之狀創皮厚甲錯刺起是也其創
血癢恒欲搔カ、カ、カ凡之汁出其初皆是風邪折而所生而
創裏之有虫也

醫門方療甲疽其候甲際生怒肉痛不得著鞋ハク 与靴同
膿血不心方

右取石膽火上燒令烟盡研カ、カ朱傳瘡上消痛カ、カ

不過三五度必老極効宜保愛之

隨時方治甲疽方目割甲傷肌作瘡瘻浸淫相染

膿益如火燒瘡日夜漸引名贅不能療者此方必老

如神

綠欖狀似朴消綠色炭燒沸盡俟香色赤停

於筒取好者搗篩為散庶石不堪弃之勿用

右若患前件瘡者先以塩湯淨洗以綠欖散厚

傅之用帛纏裹經一日膿膿水即干若覺瘡干

急痛即塗蘓取潤每一兩日一洗厚傅之病

初患瘡尚小膿ナ小未多之時只取少許散藥

和蘘如軟麵ヤハラカムタラ用傳一兩日即差此方要字は本に在るが事槌要方同之

治腸癰方第十二

病源論云腸癰者寒溫不適トモタ喜怒无度所致邪氣与

榮衛相干シカシ在腸内遇熱加之血氣蘊積結聚成癰

熱積不散シ血肉腐壞化而為膿ナル其病之狀少腹嵌

強ツ小便似淋惡寒身皮甲錯アヘリ腹皮急如腫狀タル甚者

腹脹大轉側聞水聲ツラシ或繞吞生創メツハ而穿膿出又

大便膿血似赤白下ハ而實非者是腸癰レヲ而不曉治モ

之錯者則斂人^{タカハル}

千金方腸癰之為病小腹重而桡強^{ナセシ}之則痛小便數^{シツ}

似淋時汗出復惡寒其身皮甲錯腹皮急如腫狀

又云繞脊有創如粟皮熱便膿血似赤白下必死^{メク}

治之方

屈兩肘正灸肘頭銳骨各百壯則下膿血即愈^{カメシク}

又方大黃四兩牡丹皮三兩桃人五十枚冬休人二升^{ヤナク子ハナ}

芒消二兩五味水六升煮取一升盡服當下膿血^{アカミクセ}

集驗方治腸癰湯方

吳郡太守張氏

口トニ

薏苡いりたア 人一分 牡丹皮三兩 桃人三兩 冬菰入升

凡四物以水六升煮取二升 八再服

范汪方治腸癰方

大黃一斤金色者 大棗十六枚オホナハメ

凡二物以水一斗煮取三升宿勿食能一服須臾

攻痛如火燒之癰壞而即随大便出

醫門方療腸癰方

甘依子かりふモノ 一分 牡丹皮 大黃男侵 芒消オホシホ 各三兩

桃人オホシ 甘草トカリヲ 水七升煮取二升半下大黃

更煮二三沸絞去滓內芒消入溫三服當

下膿血

治肺癰方第十三

病源論云肺癰者由風寒傷於肺其氣結聚所成也肺癰之狀其秋膏內滿隱々痛而戰寒又肺癰有膿而區者不須治其區也膿止自愈

又云咽干口內燥而不渴時々出濁唾腥臭久々吐膿

如粳米粥者難治

又云癰膿吐如粥始萌可救膿成則死

又云肺癰者在膏肓效有血也

千金方云效膏中滿而偏振寒脉數咽乾而不渴
時、濁唾腥臭、口出膿如粳米粥是為肺癰枯
梗湯主之

桔梗三枚 甘草一兩

凡二物以咀以水三升煮一升校去滓適寒溫
分為再服朝飲暮吐膿血即愈葛氏方同之

范汪方治肺癰方用

薤白一升以咀咀淳苦酒三升煮得一升適寒溫

一服有膿血當吐之

此証無字底本在醫方類聚
葛氏方同之

百濟新集方治肺癰方

黃耆一兩以水三升煮取一升分二服

葛氏方同之

僧深方治肺癰經時不差桔梗湯主之方

桔梗三兩甘草薏苡人敗醬オホホコ干地黄木谷オホクサ

二兩當歸一兩桑根皮一升

凡八物切以水一斗五升煮大豆四升取七升汁去

豆內清酒三升合藥煮取三升半去滓服七

合日三夜再禁生菜

醫門方療肺癰喘氣急卧不得安者方

亭歷子三兩ハナタカナ熬ハナタカナ搗如泥大棗卅枚破水二升モ

煮棗二沸去滓内亭歷シタム脂一兩シタム煎取一升
又以布濾シタム頓服之忌猪肉シタム酸シタム醎シタム

醫心方卷第十五

光康

加一見

醫心方卷第十五札記

二頁上

黃父

外臺引集
驗作黃帝

下五

當其下

外臺作下陷肌
層筋髓骨肉連

五藏血氣竭盡為
其癰下十九字

六皮爻

外臺作皮
天疾三字

三頁下

六十

八歲十八

四頁上

一九

病源作十
九外臺同

五如痛

病源作

病

下一

發契

病源作發
背發契

九伏龍

病源作
伏鬼

五

下九

六十日軒及有合

病源此七字
作牟脰二字

六頁上

疥疽

病源

作赤

下二

脾若

病源作
時若

六心

病源心下
有出字

七頁上

行陽明

病源無
此二字

下八

肥腸

病源作
非腸

九頁上

癰癰

病源

作癰疽

五四

五

病源五下有日字
作燭外臺同

六

朱疽

病源

醫心方卷第十五札記

作米疽

外臺同

行二

敗癰

病源作改

行三

治之

外臺無

小

豆

外臺此下有

方三字

覆翹草根

外臺覆翹作連

行六

脫疽

外臺作

十頁下

如小

病源同外臺

七行

又

不言

慶

作人

得針

針記

注八

行

排音肥

此慶本無

十一

行

注前白

延慶本

行下

三

者竟體膿

成

病源作名曰竟

字外

十四頁

黃耆

案帖即帖之俗

訛字外臺引

刪

防風

七味

十五頁

百主

千金作

行五

異腫

千金作

暴腫

作

六其問

千金作

行七

擒洗之

熨

千金作

之摩

下八

行

下

淡澁

外臺引

七頁上

牢斬

病源作

上二

行

下

流

下

千金作
上留

廿六頁
上五行
結絡

病源作經
絡周三字

下四

散之
病源無
之字

廿九頁
下九行

麗膝
病源作
麗膜

嫩兒
病源嫩
作嫩

廿九頁
上六行
者之

病源作
看支

廿六頁
上四行
一魚

病源魚作異
案異疑冀

下三

其黯狀實

膜

千金作其狀
不定四字

廿七頁
上六行
標疽秘方

千金有升麻黃
苓各二兩共十

味

下
行一包白
千金作
色白

醫心方卷第十六

從五位下行賦博士魚丹波介丹波宿祢康賴撰

治丁創方第一

治犯丁創方第二

治毒腫方第三

治風毒腫方第四

治風腫方第五

治熱腫方第六

治氣腫方第七

治氣痛方第八

治惡脈腫方第九

治惡肉方第十

治惡脉方第十一

治編病方第十二

治瘰癧方第十三

治癰方第十四

即瘰癧

於頸及頭腫也

治瘤^{しじま}方第十五

治諸瘻方第十六

治狼瘻方第十七

治鼯瘻方第十八

治螻蛄瘻方第十九

治蜂瘻方第二十

治蜂蟪瘻方第二十一

治蟾^第瘻方第二十二

治浮湏瘻方第二十三

治瘰癧瘻方第二十四

治轉脉瘻方第二十五

治𧈧^第瘻方第二十六

治蚯蚓瘻方第二十七

治蟻瘻方第二十八

治蝎瘻方第二十九

治蝦蟆瘻方第三十

治蛙瘻方第三十一

治蛇瘻方第三十二

治蛇蟻瘰方第卅三

治雀瘰方第卅四

治石瘰方第卅五

治風瘰方第卅六

治肉瘰方第卅七

治膿瘰方第卅八

治冷瘰方第卅九

治丁創方第一

病源論云丁創者風邪毒氣搏於肌肉所生也初如
風癩搔破青黃汁出裏有赤黑脈亦有全不令人知
忽以衣物觸及手著痛亦有肉突起如魚眼赤黑久結
皆變爛成創下有深孔如火針穿之狀初作時突

赴如迴厨蓋故謂之丁創令人惡寒四肢強痛創便
變雄黑色腫大光赴根強酸痛皆其候也在手
足頭面骨節間者最急其餘處則可也毒入腹則
煩悶不佳或如醉如此者二三日便死也

養生方云人汙入酒食內食之作丁創

凡有十種一創頭烏而強二創頭白而腫實三創
頭如豆紫色四創似葩紅色五創頭肉里脉六創頭壺
而浮虛七創頭葩而黃八創如薄色九創頭如茱萸
十創頭似石榴子

黃帝八十
難經云血氣
營氣為衛
云

千金方云論曰夫稟形之類タケ須存攝ニ養將ニ息共ヲ所百
病萌生故四時代謝ト陰陽逆興此之二氣更相擊怒當
時也必有暴氣共暴氣者每月之中必有平然太風
太霧大寒大熱若不將避人忽遇之此皆入人四體
煩打皮膚ハ溪溪ニ經脉遂使湊理擁障ニ結滯ハ陰陽
之氣不得宣寫ニ變成癰疽丁毒惡瘡諸腫至丁腫若
不預識アツカシ令人死ニ不迎辰メクラ若託覺乃欲求方其人已入木
矣所以養生之士若早識此方ハ是瘡瘻無所逃矣ハ
又云一麻子丁其狀アツカリ上起頭大ニ如黍米色ハ少為中ハ

四邊微赤多瘡忌食麻子及衣布并入麻田中

行今案錄驗方云大小如黍米粒頭里有部漿完也不異

二石丁其狀皮宗相連色烏黑如烏豆甚鞭刺不入

穴內蔭々微疼忌凡廐埽石之属今案錄驗方云頭

有部漿四畔小并粟如芥

三雄丁其狀疱頭烏廐四畔作瘡泡漿起色黃大

如錢孔忌房今案錄驗方云連根加頭黑刺不入有部漿无赤粟

四雌丁其狀瘡頭少黃向裏廐今案錄驗方云似条瘡四畔泡漿

起色赤大如錢孔忌忌房今案錄驗方云頭赤四畔黑黃泡漿有汁无粟

玉篇云
牛更及堅
也亦作硬

五火丁其狀如火瘡頭為廐黑四邊有泡漿有如

赤粟忌火灸燂主豆錄文錄也
今茶錄驗方云頭黑廐肉色赤栗

六爛丁其狀少黑有白斑瘡中有膿水形大小如匙

面忌契食爛物今茶錄驗方云大小如拭面膿血俱有四畔无赤粟

七卅六丁其狀頭為浮起形如為豆四畔起大赤今日生

一明生兩三乃至十若滿卅六藥所不治不滿者可

可治俗名黑點忌瞋喜愁恨今茶錄驗方云頭黑兩俱生但一時滿卅六

患者即死又

八蛇眼丁其狀瘡頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼體

忌蛇毒

學月二ハ長トハ

大忌惡眼人見之及嫉妬人者之

今案驗方頭黑麋
條四畔有部漿赤

粟

九搥膚丁其狀大如匙面遍瘡皆赤有黑粟起忌鹹食

今案驗方頭赤麋大如
小豆赤粟廣刻无部漿

忌水

十水洗丁其狀大如錢形或如錢孔大瘡頭白裏黑麋

外出中鞭忌飲漿水洗渡河

今案驗方頭白
麋无部漿有赤粟

忌食

十一刀鑢丁其狀瘡間狹如薤葉長一寸側內黑燒爛忌

刺及刀鑢切割今案驗方一頭三角有
部漿无夫有粟忌食

十二浮飢丁其狀瘡體曲圓少許不合長狹如薤葉大

酢麵シロコ葵等又見豹即死又大忌

今至麻駘方云七日不得食
塩及酒食五辛生冷酢滑不

得帶赤者有毒
唯用シロ白色者

又云凡治丁腫皆刺中心至痛又刺四邊十餘下令血出

去血付藥氣入針孔中佳若不達瘡裏則不相得

力也

又云治一切丁腫方

蒼耳根ナモミ莖子葉皆得燒作灰酢和作泥塗上

不過十易枝根出

又方塗雄黃末五愈神驗

本草拾遺曰石黃
法云雄黃素今人誠
取中精明者為雄
黃黑者為黃黃

凡クオスラカレモウ

瘰

山綿
寒病也

諸治也

小品云治小兒誤吞鐵珠子如大豆云々

又方苟杞^ニ煮汁冷飲一二盞弥佳^シ

録驗方云有釘毒瘡^ム中安^ム起^ル如魚眼狀赤黑瘰痛徹骨是寒毒久結^ム及在此疾也其爛成瘡下有深孔如火針穿也初作^ル安起狀如細釘^ナ蓋故謂釘^ナ之毒者言初作即服湯及諸單行治丹方法便^ル去也北方饒此疾也江東時有作者喜著^ム口裏頰邊及舌上也著之^ル黑如珠子合服湯針刺去血^ル如治丹疽法也

癰疽方治丁瘡方

以^テ甘刀割十字以銅鐵樁燒火令^シ赤創上置臍水燒

刺名曰為礫セツケフ一二遍タビタビ元毒シ實時自熱ヤム止燒毘矣クソナシ作

灰末シミ著創シヅメ它滿アツシ之即差又今葉經心方燒雖赤刺頭上ヤ

又云治惡瘡丁腫五香湯方 耆婆方同之

青木香 薰陸香 沉香 丁子香 藿香各二兩

水三升モ煮取一升半分三服得麝香ユル二分去藿香九

樣要方治丁創方

搗芫蔚又ハシキ莖菜ツケ薄腫上服汁令丁毒內消也一名益母草

百濟新集方治丁腫毒藥已入心故困死方

取菊葉カハヲヨモギ合莖ナカフ搗絞取汁三升頓服之二升 七升

醫門方療丁毒腫不問雄雌麻子等一切毒腫毒氣入腹教人方

頻煮苧杞根汁飲之

又云治丁腫方

白旂カヒコ蠶白僵石末シ和封之最佳

又方水研スリ白僵石服一盞并針開瘡ツケ傳上自消

經心方治丁腫新方

末附子スシ酢和塗上カネカハ漆復塗之ヌレ

陶景本草注治丁療方

不果乾者燒之炷絕水漬飲汁名破棺湯

蘘敬本草注丁瘡方

末自溫蠶封上根當自出極効

雀离賜食經丁瘡方

鴉招莖菜根傳之瘡根即拔

耆婆方治一切疔瘡神方

以磬磧末少付即愈

又云治人契毒疔瘡在口中方

凝水石鴉招末研之少以付瘡上日三四付即愈

今案以冷水洗之

治疔創方第二

病源論云疔創者謂丁創故暑更疔觸之若大瞋
及食猪魚麻子并杭夏（キキフ）人氣燠創（アハ）皆能疔之則更寒
乃甚於初更令創契（キキフ）所腫先寒後契（キキフ）四支沉重頭痛
心驚嘔逆煩悶則不可治之

千金方云散知疔狀但脊強瘡痛極甚不可得忍
是疔狀治之方

多搗蒼耳汁飲并塗上

天方水（ツミナ）四升煮地脫皮如鷄子大三（ヒビ）四沸去滓服立（タナトヨ）

愈^上

又云若犯者^{セウ}

取苟杞根切三升以水五升煮取一升取滓研^{ニカククク}一
上和汁一盞服之日二三服并單飲^{ニエクル}冷汁一二
盞亦佳

醫門方療犯丁腫故死者方

鴉菊菜取汁服之^{セヨ}冬月取根神驗

錄驗方治患丁瘡犯欲死方

取慈石和酢封^{ハクシトコト}豆板根出^ニ

又方石流黃モ燒臙署之

又方酢練磨礱石シ遍傳之三卷

又方取冬葵子服方寸匕日二

救急單驗方療犯丁瘡之根入腹欲死方

取東行脂又ナ和真和水絞汁飲一升モ

又云已死者

本草替穀日人屎尿皆竹屎主諸毒

取大黃龍湯一升又煖之以水カ枳口灌ナ即活甚驗

六十惡熱黃閏欲死日新者和水服

治毒腫方第三

一升最好陳久者名黃龍湯名佳

病源論云毒腫之狀トキ與風腫不殊ナラ時令人壯契其

諸法言於絞及半攪

黃龍湯

本草和名曰

陶云雙中

種年得汁

甚黑而苦者

也其葉一名玄

精

耶毒甚者入腹斂人

經心方治毒腫五香湯方

沉香 青木香 薰香^陸 丁香^{各二兩} 麝香半兩五

味以水五升煮取一升半分三服^{セヨ}

劉涓子方五香丸治惡氣腫毒方

薰陸香二分 霍香二分 青木香二分

鷄舌香二分半 鬼臼^{ハツミ}二分 大黃^{オホシ}八分 當歸^{ウツセリ}五分

升麻^{トク}三分 朱沙^{シロ}一分半 牡丹^{カンクヒ}二分 雄黃^{オウゴン}一分

右十一物搗下篩蜜和為丸清白飲^{ハナシモ}一服四丸^{コト}如

小豆大日拜

又云五毒膏治惡氣毒腫方

蜀料二兩ナシハシカミ 當歸二兩 朱沙二兩 烏頭一升オウ

苦酒一升半 猪肪六升アフラ 巴豆一升トモ 雄黃二兩

右八物ウ 吹咀キセム 以苦酒淹一宿ヒタシ 內猪肪イシ 合煎カゼヨ 微火三

上三下藥成向火摩腫上日三ヒ

集驗方治風契毒腫結赤夜于膏方ハルホシ

夜于二兩ヤラハツキ 常陸切一升イシハツキ 防已四兩アサカハラ 升麻三兩

四物切以猪膏三升微火煎常陸ニイ 小雄ルツコカシキムホリ 黃カ 綬カ 去滓カ

摩病上

葛氏方治卒患毒腫起稍廣急痛方

燒牛芩末クッ以苦酒ク和ミ傅ヘ上ニ煖復カヘ授ケル

又方鴆荏子ニ如泥塗ル上煖復カヘ授ケル之

又方以苦酒升麻及青木香ニ些真檀ニ合磨ル以拍

塗痛處良

又方但以甘刀破キ上泄去毒血ニ乃傳藥ヲ弥佳

今案取水蛭ニ令啗去惡血ニ其方在治癰疽ニ之方

千金方治惡毒腫或著陰部或偏著一邊疼急痛變

本草曰紫真檀
味鹹心微寒主惡
毒風毒

牽入少腹不可忍一宿斂入方

取迴香草搗取汁飲一升日三四服滓薄腫此外

因神方從元嘉末來用之起死人神驗

救急單驗方療一切惡腫疼痛不可忍無問冷熱大

葇菥子於保差
苗久佐

小方取葇菥子三枚オホミシヤ
ヒネムクモム
シケルヲ
フム捻ヒネムクモム按勿令破吞之驗

孟詵食經毒腫方

末赤小豆和鷄子白ア
ホコ薄之ホコ三卷

陶景本草注毒腫方

煮青木香アム浴大佳 又方服藍汁

治風毒腫方第四

病源論云風毒腫者其先赤痛磁契腫上生瘰癧瘰癧瘰癧

小瘰癧瘰癧
瘰癧瘰癧
瘰癧瘰癧

如火灼是也

小品方云有風契毒相薄為腫其狀先腫契契上生瘰

瘰癧瘰癧
瘰癧瘰癧
瘰癧瘰癧

瘰癧者名風契毒也治之如治丹毒法也

瘰癧瘰癧
瘰癧瘰癧
瘰癧瘰癧

葛氏方若風毒兼改通身漸腫者方

三白草

加多一呂
久佐

生苦參昌蒲根三白根剉各一斗以水一石五斗煮

取一斗去滓內好酒一升溫服半升日三次洗目

槌要方療風毒初腫令消方

大黃二兩 亭歷子二兩

ハナツカサ 又ハナツセリ

通草二兩 莽草二兩

シキミナギ

右為散水和傳腫上煖湯之神効

ハナツセリ

三ツ治本條十二兩 疑自本條作兩

耆婆方治人風腫在皮上發有時方

升麻三兩 夜于二兩

エヒル七 又ニツクル

夕藥二兩

エヒルクハリ

三味切以水三升煮取一升分三服

治風腫方第五

病源論云風腫者腫無頭无根浮在皮上如吹也不

カインシ 風ケルカ

赤不痛移无常處而兼瘡由膜理虛而逢風所作

カカシ 風ケル

葛氏方云凡毒腫多痛風腫多痒按之隨手赴或痒

天非又風 腫病

瘰癧

カサミ疾也

隱

カサミ疾也

軟皆風腫治之方

カサミ疾也

但令人痛以手摩將拊按數百過自消

又方炒蜚矢并塩布裹熨之

又方苦酒摩桂若獨治以傳之

又方楸葉浸水中以裹腫上

又方以斂刀決破之出毒血便愈

經心方白殿治風腫毒核癰疽方

白殿二兩 黄芩半兩 茵草半兩 夕藥一兩

黄耆一兩 當歸一兩 大黃半兩 赤石脂二兩

第
倒格
迫也
摩也

八味為散ハクミ以鷄子白ハクシロ和如粥ハクシロ塗紙帖上ハクシロ煖復易ハクシロ

本草云ハクシロ竿草ハクシロ麻子ハクシロ油塗之ハクシロ

治契腫方第六ハクシロ

病源論云其契毒作者ハクシロ無政頭ハクシロ但急腫色赤而時惡ハクシロ

寒壯契煩悶不安ハクシロ

極要方療契毒腫秘之不傳方ハクシロ

皂莢ハクシロ刺一握ハクシロ去兩頭ハクシロ

右以水一大升煮取半升去滓頓服之取痢其腫ハクシロ

如湯洗雪ハクシロ

醫心方卷之六

ト三

又云療一切契毒腫忽發頸項脅背上即封不成膿
方

生地黄二升 香豉半升 芒消五兩

右搗令契以傳腫上厚二分日五六付消止ト、丁又ヤム

救急單驗方療契毒腫方

取桑樹東南根下土和水作泥餅安腫上以艾灸オイ

之取契應即心男女並同ト、イ

廣濟方療契毒腫方

取牛脇骨燒為灰以太酢和如泥塗上乾易ヲ

早治本无重其分同ト、重其分有

耆婆方治人契腫疼痛方

升麻三兩 夜干二兩 大黃二兩 芫消二兩

青木香一兩 女子一兩 甘草半兩 炙

七昧劉以水六升煮取三升內芫消攪令調分

三服得下利即差

治氣腫方第七

病源論云氣腫病者其狀如癰無頭虛腫色不變皮

上忽手纔着便即痛是也此風邪搏於氣所生也

小品方云有氣腫病其狀如癰無頭虛腫色不變皮上

急痛手裁暑使覺痛此由體熱當風復被累冷涼

疝之結成氣腫也

宜服五香連翹湯白針氣寫之傳疾梨薄亦用小豆

薄並得消也今五香連翹湯在治惡脈之方中

疾梨薄方

疾梨子二升下篩以麻油和如泥熬令焦黑以塗細

故弊布上剪如腫大勿用頭瘡之無疾梨可春本方書此字

小豆下篩鷄子白和塗腫上乾復塗之並得

消也集驗方同

治氣痛方第八

病源論云氣痛者人身忽然有一處痛發作有時痛
發則小契痛靜便如水霜所加故云氣痛也由體虛
為風邪所侵遇寒氣而折之耶氣不出故也烏果

小品方云有氣痛病身中忽有一處痛如打撲之狀不
可堪耐左右走身中發作有時痛發時則小契痛靜
時便覺其處如冷水霜雪所加此皆由冬時受濕風至
春復暴寒涼來折之不成溫病乃變作氣痛也

宜先服五香連翹湯數劑及竹瀝湯摩丹參膏及

白薇散治風契相搏結トヨリ氣痛作左右走身中或有

惡肢起者積服湯餘契未平復セ宜此白薇散以消

餘契方

白薇ミナシコクセ六分又クロクセ又萎蕤アヲガ四分ミナシセ又アミ當歸フセハ四分ミナシ麻黃カセチ三分又モハト又ヨコヒセ

秦膠ミナシ五分又ク天門冬トノクセ二分又蜀椒フセハ二分ミナシ木防已カセチ四分

紫胡ミナシ三分又茵草ハチア二分又獨活ミナシ四分又枳實カセチ四分

烏頭ミナシ二分又木ハチア六分又人參ミナシ四分又夜于カセチ六分又

山茱萸ミナシ四分又青木香ミナシ四分又防風カセチ六分又白芷ミナシ三分又

凡此物搗下絹篩以酢漿服方寸匕漸至二匕

日三少嫩人隨長少減服之毒殺者可用酒也

已上集驗
方同之

治惡眩腫方第九

八難經曰
病源論云惡核腫者肉裏忽有核累累如人指著環者

病源論云惡核腫者肉裏忽有核累累如梅李有如

豆粒皮內瘰癧痛左右走身中卒然而起此風耶挾毒八七三

射功小品方曰
射功二名極
批三名漢
毒其虫取如甲虫者

所成其只似射工毒初得無常處多則痛不即治

因水勢以射
人云

毒入腹煩悶惡寒即斂人也久不斂則變作瘰

小品方云此虫有大小
者春後射人多不即
作瘰癧人

小品方云有惡眩病者完中忽有眩黑如梅李核

乃即可成
瘰癧耳

小者如豆粒皮肉中瘰癧痛左右走人身中壯熱瘰

病源論
云江南
有射工
毒虫名
短批名
蟻常游
胸水肉

瘰癧畏寒是也九與諸瘡痕瘰癧結筋相似其瘡痕瘰癧要同瘡而生是緩疾九無毒其惡脈病卒然而起有毒不治入腹煩悶則斂人南方多有此疾皆是冬月受溫風至春復有暴寒冷相搏氣結成此毒也宜服五香連翹湯以小豆薄塗之得消也六者五香湯去滓時之洗漬ヒク仕之消化之後以丹參膏傅餘脈令消盡不消盡者還傅小豆薄也

五香連翹湯治惡脈及惡脈瘰癧風結諸脈腫氣痛方青木香二兩 麝香半兩 沉香二兩 薰陸香兩

鷄舌香一兩 連翹子二兩 夜干二兩 升麻二兩

獨活二兩 寄生二兩 大黃三兩 甘草二兩

淡竹瀝二升

凡十三物キニム以水九升分リ煮藥計水減半シ許可ルヘ內竹

瀝汁又キセウ剋取三升分三服

丹參膏治惡脉及惡脉瘰癧風結諸脉腫痛氣腫方

丹參二兩 茺藺根二兩ソクトク 茵草半兩 秦膠一兩

獨活一兩 躑躅花半兩 蜀椒半兩 白芨一兩カミ

牛膝一兩サラクノキ 菊華一兩カハフオハキ 木防已一兩 烏頭一兩

九十二物細切チカキレ麝香セウカウ以苦酒二升漬之一宿ヒタセ復月
半日急疾即ツカ剪之以猪膏ブカイロウ四升又シ剪令苦酒竭
勿令ニカ暴雄ニカ熬也去滓以膏塗諸疾上日五ハクセシム至
良

葛氏方治惡核腫結不肯散者方

烏カラ嬰ム根ア外エ麻マ 各二兩

以水三升煮取半升分再服以滓熨上

又方燒白鵝矢以水服三方寸匕以肉薄腫上

又方苦酒摩カキハタ由又シ跋塗之カキハタ搗小蒜薄之

錄驗方治惡核腫毒入腹五香湯方

董陸香射香唐沉香鷄舌香青木香各二兩

凡五物以水六升煮取二升半過寒溫分作三服
不レ差イ復エ作ス云レ合シ香ヲ可レ盡ス五香各一兩水四升煮
取三升六為二服又滓薄腫腫上神良

僧深方凡得惡腫皆累ニ平ニ初始大如半梅桃或有核
无核或痛或不痛其長甚速須申如鷄鴨大即不治
之腫契為進頰肉拘攣腫毒內侵填塞血氣不
通一每宿便致人初覺此病便急宜灸當中央及繞腫

黃耆三兩 真當歸三兩

大黃三兩

芍藥二兩

白朮三兩

黃芩三兩

防風三兩

夕藥二兩

鷄子十枚

黃連二兩

凡十物

鷄子白

和塗紙上

腫上

灸易

又方

鷄子白

以裹盛

薄紙上

亦可

令連

消用

アクル

多得効驗

治惡肉方第十

病源論云惡肉者身裏忽有肉如赤豆粒突出細

長乃如牛馬乳大亦如鷄冠之狀不痛也久不治長不

已春冬被惡風所傷風入肌肉結乘血積而生也

小品方云有惡肉病身中忽有肉如赤豆粒突出便長

推出不息如牛馬乳亦如鷄冠狀也不治其為自推出

肯心亦不痛癢也此由春冬特受惡風入肌脉中變

成此疾也

治之宜服漏蘆湯外燒鐵礬之日ヤク稍礬令雄盡シクコカミシ

也礬竟以外麻膏傳之積日乃耄耳今案漏蘆湯外麻膏

在治丹之方

治惡脉病方第十一

病源論云惡脉者身裏忽有赤絡脉起（虚多及痛也）寵從聚（力孔及品孔文一差哉）如

死蚯蚓狀者（カフラミバ他）似有（下ミ）水在脉中（神上）長短皆逐其胎脉所出

見是也由春冬受惡風入絡脉中其血凝結所作也（十九）

小品方治惡脉病方

宜服五香連翹湯及竹瀝湯鑱去惡血傳丹奉膏

積日則老六以自椎鷄屎塗之（クシス）集驗方同之

劉涓子方治惡脉腫毒方

烏扇二兩外麻二兩（生者用兩）文子十四枚（公七年九月）礬破

右三物切以酒三升煮取一升半分為再服以滓薄（十九）

腫上甚良

又云升麻湯治惡脉毒腫方

升麻一兩 吳茱萸一兩 薰陸香二兩 鷄香各二兩

雄黃一兩 鼈甲二兩カハカス 甘草一兩 烏扇三兩

青木香一兩

右九物以水七升煮取二升半過寒溫分三服相去

一里治脉腫神良

今案升麻湯又有小品治丹之方藥種与此不同

脇
急忍反
筋肉也

治漏病方第十二

病源論云漏病者由勞役失體熱盛因取風冷而為

范汪月文
神所在法
云廿九日神
在鼠健環
陰氣街
華他云在
膝脛

黃帝八十二
難經忘脉
後清

涼濕所折クシカ入於肌肉筋脉結聚所成也其狀赤脉起如

編繩急痛壯熱其發於脚者喜從鼯僕起至踝如

如編繩故謂漏病也其發於臂者喜腋下起至手

也不即治取其潰去膿則筋牽縮也其著脚者不

治不消復不潰其熱歇氣不散變作腫脉緩相薄

腫膈已成膿

時疫及足腫痛也所力及不消也

小品方治膈病方

宜服漏蘆湯自下外以鋒針數鑱去血氣針寫其結

脈處傳小豆薄則消皆可依治丹法消之且用

治瘻三物ハチノハ甘焦ハチノハ薄ハチノハ也及至潰成膿火針傳膏

散之治癰法之千金方

葛氏方治皮肉平腫起夾長赤痛名曰編方

鹿角一兩 白蔞一兩 杜鵑シクキツカヒ四兩 附子二兩 炮

右四物搗下篩苦酒和塗帛以貼之于腹樓之

治瘻即瘻方第十三

病源論云風邪毒氣容於肌肉隨虛亂而停結為瘻

瘻或如梅李棗等核大小兩三相連在皮間而特發

寒熱是也久則變膿潰成瘻也

腧驗方云療癰瘰癧唯須以真針モチササ之小者即消大者

即斂ツム然後出膿便老ナ隔日一針

千金方云一切癰瘰癧在頂上及陰處但有宗結セツ段似

作痿及癰痛者方カクホ 子結及癰也瘡也

以獨頭蒜截兩頭却心大作艾炷モミ秤蒜大小ハク估

瘰癧子上灸之勿令上破ヤフラ但取契クサ而已ノミ然七蒜三

壯日之灸之取消心

又方白強蟹為散水服五升七日三十日老

又方干猫舌末付瘡上

又方狼矢灰付上

醫門方治瘰癧方

尖針九ノト丸瘰癧子令穿通ホリ以石流黃如豆大トホキ針中

燒針ヤキ勸令赤燥ハシ之藥流入瘡中其瘡老即

消極驗也

瘰癧人近治瘰癧瘡
在曲頸前一寸二分

小品方治卅歲瘰癧瘰癧方

於部及頸腫也

海藻一升一ノミ消襄盛イシ好清酒二斗ヒタセ漬之春夏

服二合ナ消盡復以酒二斗ナ漬之飲如上法此酒

盡ナ爆海藻令ナ終末服方寸匕日三ナ藥无ナ所禁

一劑不愈イエ更作シ不過三劑也今案葛氏方治頸下瘰癧墨如梅李

宜使速消

劉涓子方治寒熱瘰癧在頸腋下皆如李大方

人參四分 甘草四分 白芷四分 于薑四分

凡四物皆同分治ククセ合ヒ薤ヒ先食ヒ服方寸匕日三少カクカ

小品方云人年六歲以上為小十八以上為少之小服半方寸匕良一方以酒服龍門方令速消云

范汪方治瘰癧朝夕莢契龍骨散方

龍骨七分牡蠣三分 一方分等

王子年拾遺云方丈山東龍場地方十里

凡二物治合下薤先食服五分匕日三龍門方令速消云

僧深方治諸瘰癧因瘡壯熱方

白銀灰二升

右一物沸湯モ和如糜カニ熱下ハシ掩其上甚良

瘰癧方療瘰癧成瘰作孔方

露蜂房二枚オホナツル炙炙リ末

和臘月猪塗孔上痛

瘰瘰癧
疥癩

治瘰方第十四

病源論云瘰者由憂恚氣結ホル所生ナ亦由飲沙水沙

隨氣入於脉搏於頸下而成之初作与瘰核相似而

當頸下也皮寬不急垂腿音格然其是也恚氣結成瘰者

イタカラ

又音通

音情氣滿也

瘰癧方第十四

ト

但垂腿レ无脉也飲沙水成瘰者有核痛レ無根浮動在

皮中又云有三種瘰有血瘰可破レ之有息肉瘰可

割レ之有氣瘰可具針ツケム之養生方云諸山水里土中

出泉流者不可久居クル常食作瘰病動氣增患

小品方云有瘰病者始作与瘰脉相似其瘰病生頸

下シタ當中央不偏ムラ南邊也皮寬ホシ不急垂腿イタカラ然則是瘰

也中国人患氣結瘰者但垂腿レ无脉也長安及襄陽

蠻人其飲沙水喜病沙瘰有脉瘰クラクラミ耳无根浮動在

皮中

治諸癭良方

小麦一斗以淳苦酒和名酒一斗漬小麦令穉トクメシ漉出シタス曝コホシ

令燎カ分セシム復漬之苦酒盡曝シラシ麦燎シ擣下菰以海蓂

三兩別擣末合治セクシイ之温酒服方寸匕日三禁塩生

生更猪宗生菜數用有驗也今菴龍門方加昆布三兩范汪方云治卅年

癭及瘰癧

千金方治癭方

昆布二兩切キリ如指大酢漬令咽ツツシム汁盡則愈ト

又方冬風府穴百然又冬大椎百壯

小品方曰風府一穴在頂後髮際下小入髮中當兩筋中夾陷中是也

卷之六

十五

又方灸大椎兩邊相去各一寸半少下垂各卅壯

葛氏方治頸下平結累累漸大欲成癭方

海藻一升酒二斗漬一宿稍ハ啗ハ二合咽之ハ酒

盡取滓末服方寸匕日三

范汪方治癭昆布丸方

昆布八兩 海藻八兩ハ洗

凡二物ハ下篩和以蜜丸先食含如半棗大稍

咽之ハ日五服不知稍增ハ知為度

効驗方治癭昆布丸方

小品方
大椎以
上諸癭
上屬頸
崇骨也
崇骨與
崇骨骨
相接處
其節
也

父選上林賦
一麥藁う

昆布二分 松蘿二分 海藻五分

凡三物治^{クタク}含下^{カニ}篩以白蜜丸如李子含咀^{才與及 疾略又}嚼^{カニハム}

咽其汁日三夜二

槎要方治癭海藻散方

海藻十分 昆布一兩 海蛤^{ハナシ}一兩 通草一兩

松蘿一兩 干薑一兩 桂心一兩 一方无干薑代^{白薑一兩}

右七物下篩湄服方寸匕日三

耆婆方治人氣癭方

松蘿二兩 海藻三兩 通草二兩 半复三兩^{洗一}

昆布二分

ナニ

桂心二兩 海蛤三兩 昆布三兩 干薑六兩

伏苓二兩

三ツノ条クセ又セキセキ名クセ
細辛三兩

桔梗二兩

右十一味 鵠脂為散 以酒服一方寸匕 日三

又方 炒塩薄平

玉霜方 治卅年癰及瘰癧方

海藻八兩 貝母二兩

ハクリ
五夜根二兩 麦麴二分

四味作散 酒服方寸匕 日三

経心方同之

廣利方 療癰結氣方

昆布二大兩

暖水洗去凡チ
鹹味寸切

小麦三大合

以水二大升煮取小麥熟擇取昆布空腹吞三五

斤津液細嚥之日再含居生冷油膩

治瘤方第十五力周及腫也瘡肉也

病源論云瘤者皮肉中忽腫起初如梅李大漸長大不

瘳不痛又不結強言瘤結不散謂之爲瘤不治乃

至瘳大則不復痛不能斂人尤慎不可輒破之

范汪方云發腫都軟者無瘤也發腫狀如蛇雖極大

此宗瘤非癰也

千金方治瘤病方

本草云蛇類一名蛇瘰也色而支

本草拾遺日瘰癧也

愚考又瘰癧一名守宮瘰癧在潮

蛇瘰癧一名守宮瘰癧

樊石 芎藭 當歸 大黃 黃連 芍藥

白殿 黃芩 各二 吳茱萸 一分

九味為末鷄子黃和之塗細故布上隨痛大小以薄帖之干即易看藥當乾作膿暗細從孔出也按却膿血盡著生宗膏若膿不盡復起故也

又云生宗膏主癰瘤潰漏及金瘡凡百瘡方

當歸一兩 附子一兩 甘草一兩 白芷一兩

芎藭一兩 生地黃五兩 薤白二兩

七味切レ猪脂二升半煎白芷黃付之日三僧深方

天云凡宗痛勿治之致人慎之

僧深方治血瘤方

唐宗割炭火炙アリ全契掩上榆之モテタ冷渡炙令宗アフル燒モハ燂ヒ可四炙ヒ四易之タシタヨ若不除炙七生便足也アス

玉箱方楊樹酒治瘤癭方

河邊水所注楊樹根ボク并ナ竹タケ熟洗アサヒ細桂チカク以水ミヅ石煮取シヨ五斗ヲ用米三斗麵三斗カ釀之カ酒成服一升セヨ集驗方同之

治諸瘻方第十六

顛顛耳前
動也

病源論云痿病之生或因寒熱不調致血氣壅結所
作或由飲食乖昂狼臯之精入於府藏毒流注脉變
化而生皆能使血脉結聚寒熱相交久則成膿而
潰漏也生身體皮肉者亦有始結腫与石癰相似所
為異者其腫之中按之壘有數核喜發於頸邊俱起
便是痿證也亦發兩腋下及兩顙顙間初作喜不痛
不契若失時不即治生寒熱也所發之軀而有輕重
者有兩一則交口上脰有結核大小見寔或如桃李大此
虫之窠窟正在其中二則發口之下元有結核而穿

潰王成創

又云重毒之居或府藏無定諸痿發身體亦有數處
其相通者多死其痿形狀起發之由今辨干後章

養生方云六月勿食自落地五葉淫宿蚍蜉螻蛄蜥蜴
上喜為九癭十二月勿食獾鼯殘肉生創及癭出頸項
及口裏或生咽內也

又云決其死生者及其目視之其中有赤脈從上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見三脈三歲死見三脈三歲死赤脈而不下

貫瞳子可治也

又云方說九瘻者是狼瘻鼯瘻騷蛇瘻跗瘻趾瘻
瘻跗^{化名}瘻浮疽瘻瘰瘻轉脉瘻此頸之九瘻也
又云復有卅六種瘻方次第顯其名而有甄琅璠
劉等諸瘻非九瘻之名此卽是卅六種瘻之數也
小品方云有瘻者始結腫与石癰相似所可為異者
其一種中核之壘有數版便是也

初作毒不痛不契卽以練石薄傅之內服防已連
翹陽下之便可得消若失時不治結膿者亦以練石

薄ハ令速乾ヤス之用大尉膏散如治癰法初作即ハス

豆薄塗之ス之消

又云桐君說赤小豆白蠶黃蒼黃耆牡蠣凡五物分等

下篩酒服方寸匕

治癭瘤諸癭昆布丸方

昆布八兩炙海藻七兩洗小麦一升炙海蛤五兩

松蘿四兩連翹二兩白頭オキナクセ云二兩

右七物搗下篩和蜜丸如梧子服十九日三稍加

丸

千金方云九瘻有似石癰。墨然作瘰。子有核在兩頸
及腋下。不痛不契者。皆練石散付內服。五香連翹湯
下之。已潰者。療如癰法。今案五香連翹湯有治惡服方

九項邊。腋下先作瘰。瘰者。欲作漏也。宜禁五辛酒麪
及諸契食。

又云灸漏方

鳩生章陸根。拾ヒキリ作サリ梓子。豈漏上以艾灸。上梓子契チ易カ

之灸。三四升艾。卷ヒキリ經心方同之。

又方。亭歷二合。豉一升。二味合。鳩令契ヒキリ作サリ麪如大餅餅字也

錢厚二分許取一枚當創孔之作大艾炷如小指
大艾炷上三炷一易三炷九易日三障三百度一
矣

又方灸腰周四畔即老

又云治漏方

搗土伏根薄之燥復易不限時節

又方燒死蛻頭末酢和塗之

又方死蛇灰酢和付之

葛氏方通治諸瘻方

取地中階行集罷一頭破腹去腸干之火炙令アトク年未九

令可成屑末以鴈月猪脂和傳瘡上火ノ

又方燒驢脂作屑猪膏和傳之又方白犬骨燒末以猪膏和傳之

又治諸瘻瘻口裏齒類間者方又方白犬骨燒末以猪膏和傳之

東行中練根細坐三四升以水濃煮取汁食之丸 アツキ アツキ アツキ

數吐易勿咽之アツキ アツキ アツキ

耆婆方治人卅年瘻瘡方

取蒲葦根セウシ令上煖カハカシ子丸チ根去土大釜中以水煮令熟火ノ

去滓量大瓮中投取清汁煎之若盛復煎ホトキフ 鏡放小器アツキ アツキ アツキ

中^ウ藥令^{シテ}如^ク薄糊^{ホク}內^ニ器^キ中^ニ若^{ハニ}有^ラ痼^コ去^ク之^ニ內^ニ藥^{ヤク}若^ハ病^{ビョウ}
深^{フシ}以^テ鷄^キ毛^{モウ}取^リ藥^{ヤク}冷^{レイ}暖^{ナン}軟^{カン}以^テ內^ニ中^ニ老^ロ乃^ハ以^テ取^リ藥^{ヤク}蒟^コ
藿^コ滓^シ舉^ス著^モ其^レ人^ニ老^ロ而^{シテ}不^レ報^ハ是^レ者^ハ取^リ滓^シ燒^{ヤク}還^ヘ菰^コ痿^シ
也^セ秘^シ之^ニ

廣^{ワウ}濟^ジ方^フ療^{リョウ}痿^シ久^ク不^レ老^ロ方^フ

巴^ハ豆^{トウ}一^{イチ}兩^{リョウ}去^ク皮^ヒ大^{ダイ}棗^{サウ}一^{イチ}升^{シヨウ}

石^{シヨク}以^テ水^{スイ}五^ゴ升^{シヨウ}煮^シ取^リ一^{イチ}升^{シヨウ}絞^シ去^ク滓^シ更^ニ煎^{ケン}如^ク稠^{チウ}餛^{キン}傳^{デン}瘡^{サウ}

上^{ジョウ}日^{ニチ}三^{サン}

劉^{リウ}涓^{セン}子^シ方^フ治^リ痿^シ衆^{シュウ}方^フ不^レ老^ロ効^{キョウ}驗^{ケン}方^フ

劉涓子方卷下

下

本草和名曰
牡蒙名馬莖
生山谷隋處

取牡蒙數兩搗之湯和通寒溫取一升許薄瘡
上冷復易經日蓋佳

新録方治諸瘻方

露蟬房末酒服方寸匕

又方菟皮灰付之

又方芥子末付之

又方桃菜搗如泥封之

救急單驗方療諸瘻瘡方

莢楸枝葉淨洗瘡內孔中大驗

又方石留黃末量瘡孔中以艾炷三驗ア

陶景本草注諸痿方

玄參酒漬飲之良フシノセ

又方鼯鼠音偏蹄燒末酒服之ヒツメ

蘇敬本草注諸痿方ワコモノ

馬莧ウアヒエ搗指之ルシ

馬莧新條本草云布地生實至微細俗呼為馬莧莧品可食小酸

本草拾遺曰莧及馬齒陶以馬齒與莧同類

又方食雉フ宗良

崔禹錫食經諸痿方フシテチ

食一兩竹蓐終身不病也

治狼瘡方第十七

病源論云狼瘡者年少之時不自謹慎或大怒氣

上不下之所生也始發之時在於頸項有根出缺盆上

缺盆在肩上橫骨陷者中

轉連耳本根在肝

劉涓子方治狼瘡為病始發於頸腫有根起於缺盆

上轉連耳本此因憂患氣上不得下

空青二分 蝟螬肝二片 蝟螬肝一貝 芎藭半分

獨活一分 女婦草一分 黃芩一分 鼈甲一分

斑苗一分 乾薑一分 當歸一分 蜀椒一枚

斑苗

本草云甲上黃

黑斑也如巴豆大

迴香一分 煑石一分 地膽一分

十五物 鴛下篩 酒服方寸許 匕酒 勿食大酢 日三十五日服之

治鼯瘻方第十八

病源論云鼯瘻者 飲食之時不擇虫蛆之毒而褻化入於藏 出於脉不去 使人寒熱其根在肺 出於頸項 千金方療鼯瘻瘡 後復發及不愈 出膿血不止方

以不中水猪脂 咬咀生地黄 內脂中 令其脂与地黄足相淹 和藥六七沸 乘灰汁 淨洗瘡去惡汁 以

地黄膏塗上日一易

又云鼯瘻腫核痛末成膿方

以栢葉傳暑腫上敷塩著葉上熨之令契氣
下即消神良

又云治風瘻及鼯瘻方

赤小豆白粳黃耆牡蠣

凡四味等分酒服方寸匕日三

今葉小品方加
黃耆治諸瘻

葛氏方治鼯瘻方

取カシカラキ又クダキ櫚白皮キ濃煮取二升服一升當吐ハク鼯子

又方鴛車前草オホコ以薄之

又方巴豆去心皮ハチ以和艾ヨモギ作炷灸瘡上

又方取小鼯子剥去皮炙令煖ハチ鴛末以臈月猪

膏和傅之

又云若已有口膿血出者チ以鰾牛矢塗之アツキ日三

范汪方治頸鼠痿黑方

貝母二分 干薑一分 桂心一分 蜀椒一分

吳茱萸一分 高良カセモノ一分

凡六物治下節先食以酒服一撮セシ良

錄驗方治鼠瘻及癰^凡年^凡為頭散方^凡為頭^凡兩^凡黃藥^{ハタ}二兩^{ハタ}

凡二物治下篩酒服^凡一刀圭^凡日八夜四起^凡令藥^凡契^凡相^凡繼^凡初^凡得^凡癰^凡而^凡服^凡良

劉涓子方治鼠瘻方

又方死蛭頭燒作屑苦酒和塗之

汪心方治鼠瘻方

燒地黃葉帖上得差

又云鼠子瘻結核未破者用大針^セ之^セ无^シ不^レ差

治螻蛄瘻方第十九

病源論云螻蛄瘻者食菓莢子不避^ル有^ル虫^ル即便^ル敗

食之有毒不去變化所生也^三在於頸上^三狀如鵝形^{カクヘ}隱^{カク}漸^シ

而出其根在大腸

集驗方治蜈蚣瘰癧方

取蜈蚣^{ナギキ}胎二七枚^{ナギキ}酒和傳上

千金方有蜈蚣瘰癧方

檨葉灰先以酒漬煮檨葉取汁洗拭^{ツギヒ}干^{ホシ}內灰

創中

劉涓子方治蜈蚣瘰癧始^シ發^{ハシ}於頸^コ狀如腫^ミ此得之時食菓子

茱實^{アキラ}毒^ニ不去^{ナリ}核^{コトクイナラ}

龍骨半分 桂心一分 干薑一分 桔梗一分

樊石一分 附子二兩 獨活一分 芎藭半分

蜀椒一百枚

石九物ナレ搗下篩別取干棗ナレ十枚ナレ去核ナレ合ナレ搗之取
酢漿和之便得九日服五丸如大豆ナレ湯漿服之

治蜂瘻方第卅

病源論云蜂瘻者食飲勞倦渴之多飲ナレ流水即得
蜂毒ナレ不去變化所生也ナレ發在頸癰ナレ三四處俱腫以
潰生創狀如癰形ナレ毫而後移其根在脾ナレ

劉涓子方治蜂瘻始發於頸瘰癧三四處俱腫連
以潰移此得之多飲流水レ有蜂餘毒不去レ

蜂房一具螫甲一分迴香子一分茱萸一分
柰二百枚干薑一分

右六物搗下作散傅創孔口上日十度

千金方有蜂瘻方

人矢馳脫モネ尸獵月猪膏和付孔中之

又方蜂窠ハル尸臘月猪膏和付孔中

葛氏方云若著鼻内外查瘤膿血出者ハル是蜂瘻取

軌軌本草名目
軌軌字未詳

軌軌蜂房火炙焦末溫酒服方寸匕日一

軌古胡文論語云軌
軌器也亦曰軌
二升曰軌也

治軌軌瘰癧方第廿一

軌軌力食反
軌軌苦軌
軌軌王根
也

病源論云軌瘰癧者曰寒腹中臌脹所得寒毒不去

變化所生也始發之時在其頸項使人狀若傷寒有

婁唐集及
定

以齊癰婁ハタケ孔出其根在肺

思議及說文乾瘍也

劉涓子方治軌瘰癧瘰癧始發於頸初得如傷寒此目食

中有軌瘰癧毒不去

桃白皮一分 皂莢四分 知母ヤマトノコノ又ヤマトノ一分 雌黃一分 干地黄分

本草一名乾地黄

梔白皮一分 白朮四分 知母一分 雌黃一分 干地黄分

本草拾遺曰
青黛味鹹寒
生海云從波斯
國采亦太原
作

蝟皮四分 獨活一升 樹一百枚 青黛二升 斑蝥一升

白芷一升 栝脂一升 夕藥一升 海基一升 當歸一升

石十五物合搗作散下篩服一匙上日三病在裏

空腹服在外先食後服之又方无斑蝥

治蝟蝟瘰方第廿二

病源論云蝟蝟瘰者恐懼愁憂思慮哭泣不止餘毒

變化所生也始發之時在其頸項無頸尾如棗核或

移動皮中使人寒熱心滿其根在心

劉涓子方云治蝟蝟瘰始發頸无頸尾如棗核潰之多

在人皮中使人寒熱心滿此因喜怒哭泣

空青二升 當歸二升 細辛一兩 干薑二升 一方用皮

地膽

本草曰狀如大馬蟻
有小翼子偽者即
斑苗所化狀如大豆

苟杞根一升 斑苗一升 剉ナカリ地膽一升 干為脂如三木豆ナカリ

石八物合治下篩ナカリ作散服方寸匕日三以酢漿下ナカリ

散病在上倒輪卧ナカリ在下高枕使藥流下ナカリ

治浮疽瘰癧方第廿三

病源論云浮疽瘰癧者曰瘰結馳思往反變化所生始發ナカリ

之時在於頸項亦拔下ナカリ如兩指元頸尾使人寒熱欲坐ナカリ

其根在膽

劉涓子方治浮沮痿始發於頸如雨指使人寒熱欲卧

得之目思慮憂滿其根在膽地脈主之甘草為佐方

石流黃一分干薑一分龍膽草二分細辛二分

地膽去一分石決明去一分續斷去一分オニヤカラ大黃半份

陰蘆根一分

右九物下節傳瘡上日四五

治瘰癧瘻方第廿四

病源論云瘰癧瘻者因強力入水坐濕地元或新陳瘡入

頭中流在頸上之所生也ナカ始發之時在其頸項恒有

膿使人寒熱其根在腎

劉涓子方治瘰癧瘻始發於頸有根令人寒熱此得之
新沐汁入頸中下流於頸

伏苓一兩續斷一分煨石二分干地黄一分

空青一分礬石一分煉干薑一分桔梗一分

蜀椒一分ササリウツヒチキ又ムクセキ恒山皮一分コカ斑苗一分クセキ烏鰒一分葵

附子一合炮干薑一分于狸宗一分

右十五物搗合下篩以白蜜和酒服如大豆十九

日再タヒ

治轉脈痿方第廿五

濯、
徒角又
騰中水之
聲

病源論云轉脈痿者因飲酒大醉夜卧不安驚悸欲
轉側^レ共枕之所生也始發之時在頸項^レ濯^レ脈轉身始振^{フル}
使人寒^{フル}其根在小腸

劉涓子方治轉脈痿始發於頸濯^{フル}脈轉身始振寒^{フル}
契此得之驚卧共枕

涿青二分 人參二分 當歸二兩 升麻一分

麥門冬二兩^{ヤナヒナ} 心^去 大黃二分 鍾乳二分 桂心二兩

甘草半分 防風一分 白朮一分 地膽一分

續斷一分

麝香一分

未 礬石半分

生用之

右十五物合搗下篩麝香未篩合更搗令調白

蜜和如大豆溫酒服十九日三勿食生菜生菓

胆如大豆溫酒服十九日三勿食生菜生菓肥

完忌房內滿百日令得都差

治蜺頭瘻方第亦六

病源論云蜺頭瘻者由飲食居麤有蜺頭之毒入

於藏府流於經脉所生也初所生之時其狀如鼯

乳直下腫如覆^{タケ}斗而瘻^{オホル}搔之疼痺至百日有七八

孔入三寸中生蛻頭不有百數蛻蝦成尾自覆判人大如五升至三

年斂人

千金方治蛻頭癭方

牛矢灰和臘月猪膏付之

又方集牛矢塗之

治蛻頭癭方第七

病源論云蛻頭癭者由居處飲食有蛻頭之氣或因飲
食入腹內流於經脉所生其根在大腸其狀腫極潰下
漏之

集驗方蚯蚓瘻方

取蜈蚣胎大者二七枚酒和傳瘡上

劉涓子方治蚯蚓瘻方

鴨膏和胡粉傳瘡上已靈下

千金方有蚯蚓瘻方

蚯蚓矢雞矢末之以二月牡脂下下頷髓和付

治蟻瘻方第十八

病源論云蟻瘻者由飲食有蟻精氣毒入於五藏流

出注脉多著頸項戴頸支創小腫核細而乃遍身疥

集驗方蟻瘻方

半復一果搗作屑以鴨膏和傳瘡上

千金方蟻瘻方

蝟皮^{クモ}肝心灰末酒服一錢上

天方雄鷄灰末付之

天方鼠灰付之

葛氏方若瘡多而孔少者是蟻瘻^{化クテキ}

本草曰取似蠶而
短小又似蠶更有
四足能爬能水

燒^{唐蘇}陵鯉鰓^{アキト}甲猪膏和傳佳

治鵠瘻方第廿九

明著又象中蠶蟲也

病源論云蝮瘻者飲食居處有蝮之毒氣入於藏
流於經脉或生腋下或生頸邊腫起如蝮虫之形
寒熱而潰成瘻久則創裏生細蝮

千金方有蝮瘻五孔六孔皆相通方

鵝茅根汁著內孔中

治蝮瘻方第卅

病源論云蝮瘻者飲食有蝮之毒氣入於藏
流於經脉結腫寒熱因潰成瘻服藥有物隨小便
出如蝮瘻之狀

千金方有蝦蟆瘰方

五月五日加七 蛇胆及野猪脂付水衣付二 蛙

治蛙瘰方第卅一

病源論云蛙瘰者飲食居處有蛙之毒氣入於藏
流於經脈而成瘰因服藥食丸隨小便出物狀如蛙形
千金方有蛙瘰方

蛇腹中蛙灰付之

治蛇瘰方第卅二

病源論云蛇瘰者居處飲食有蛇毒氣入於藏流

於脉寒熱結腫者，亂无定，因潰成瘻，服藥有物随

小便出如蛇形

千金方有蛇瘻方

蛇脫灰臘月猪脂和付之

介雅云王
注云即
似蛇龍
在穴中有蓋

治瘻瘡瘻方第三

今河北人呼
為蛇蟠

病源論云瘻瘡瘻者由居亂食飲有瘻瘡之毒氣

本草瘻道
云瘻端有
毒云云似蛇
蟠云云

入於藏流於經脉所生初得之時如棗核許或滿百日

或滿周年走不一亂成孔膿汁潰漏

千金方有瘻瘡瘻方

鴉依根付至卷填口味

治雀癭方第卅四

病源論云雀癭者居亂飲食有雀之毒氣入於藏
流脉莖无定處因潰成癭服藥有物隨小便出狀
如雀齧

千金方有雀癭方

母猪矢灰和臘月猪膏付出如雀

字治本無膏字醫本等句

治石癭方第卅五

病源論云石癭之初狀起兩頭如梅李核漸實

カサリル

之強如石而寒熱然レ後潰成瘻

千金方有石瘻從兩頭出者其狀堅實キア令人寒熱方

以大錨針破之ナリ鼈黏草二分末和鷄子一枚付之

本草拾遺曰并
華水味甘平無
毒可

又方搗槐子和并華水付之

治風瘻方第卅六

病源論云風瘻者由風邪在經脈ニ結聚所成也

心方治風瘻鼈瘻方

來自皮七八斤細剉水二斗煮取汁一斗更煎付

取二升半頓服下下更上

又方燒地黃葉拓上得カ者

又方杏人一升熟搗和生猪脂傳上

千金方風痿及亂痿方

赤豆 白飯 黃耆 牡蠣

四味等分酒服方寸匕日三

治內痿方第卅七

病源論云內痿者人有發創色黑有結有膿久乃

潰出侵食筋骨謂之內痿

龍門方治內痿方

取槐白皮十兩搗丸綿裹內下部驗

又方莢楸葉作莢稠堪丸以竹筒內下部貼ナヒシヤシ

文選工賦云法時
專車注曰洪時似
蛤大者五文獨
死一事故云專車

痔瘻恙老ナ

奴冬及瘡汁也

治膿瘻方第八

病源論云諸瘻皆有膿汁此獨膿焉ナ名者是諸創

久不羣成瘻而重カヒ子為契氣ナ所乘ナ毒氣停積トナリ生膿

常不絕故謂之膿瘻

千金方有膿瘻方

桃花末和猪脂付之ヲ

又方塩麴和燒灰付之ヲ

唐韻半談及蚌屬狀如蛤
圓而厚外有硬殼橫身今
刺也

龍門方痿膿出方

石流黃末置瘡孔中以艾冬トコロ三トコロ駢トコロ

本草痿膿出方

楊ウツキ盧木モ承モ真菜汁洗之シ五シ卷

治冷痿方第卅九

病源論云冷痿者亦是諸創キレ得風冷久不差ハナ因成

痿膿汁不絕故為冷痿

千金方凡一切冷痿方

玉篇云燒同字

燒入吐出トク蚘トク虫トク灰トク先甘草湯洗痿後著灰無

醫心方卷之十一

四七

宋韻云蛇人
腹中長蟲
養生抄云食
即勿飲水生
蟲

不老者慎口味

醫心方卷第十六

醫心方卷第十六札記

二頁上

反手

病源反作及

九火針

病源火作大

下一

迴釘

病源

無與字

八行頭葩

延慶本頭下有如字

薄色

病源作金薄

三頁上

失

累作夫

八行若早

千金作準早

下一

多瘡

千金作多痒

行二

注不異

延慶本此下有忌府二字

四行凡

亂

千金作力木切

凡礫柴靚也說文靚玉

篇

覽也尔正靚蓋靚靚謂之覽郭注靚靚也今江東呼靚靚蓋靚靚

靚並急言為靚也

四頁下

大

忌有硬字

六行外

出

千金作外

七行鑲

丁

千金作錄丁

側

內黑

千金作左側內黑

八行

有粟

延慶本無有字

九行

浮靚

千金作靚

側

三頁上

牛物

千金作牛拘下同

泡色

千金作跑起

三行

三角

延慶本 七 始末唯瘡 千金作始 九 胡蘼 千金作 四 下

行 中往 往佳 六頁上 癰疽方 延慶本 癰上 九 鐵楮 楮

之 六頁上 白 澶石 澶訛澶 九 丁療 療 延慶本 蘇敬注

但云 破丁腫無治丁 九頁上 碕石 碕石未詳 宣 十頁 下九

行 疼急痛變 千金作疼 十一頁 療 療 紫瘡蓋 火礫

藥 訛 六 兼改 延慶本 十二頁上 天非友 夫訛 天夫

下 二 摩將 將訛 十三頁 政頤 病源作 色赤 以下 十

本 病源 與 八 取劑 利訛 十四頁 七昧 昧訛 十五

一 行 戶監友 戶怨 四 茵芋 延慶本 十六頁 下 貫珠

皂皂恐 上十七頁 行 瘰癧千金廿二載 上十八頁 行 小蒜說

蒜廿頁下 寵寢延慶本 行 出見病源作

上二頁 行 治瘻瘻即癰 行 氣容容訛 行 二 陽日延

作傳 行 結段似千金段 行 壯七蒜三壯 行 壯千金作七

上四行 針筋延慶本 行 一方分 行 壯延慶本

下廿四頁上 灸末延慶本 行 一 脰延慶本 行 元脰也

無脉 行 里土延慶本 行 八 癰外臺引小

六行 復痛病源痛 行 故也千金作 行 壘下五頁

累病源作 行 文口上脰病源作 見定病源作

頁下 煉石薄

案煉石未詳恐是爛石草園注馬先蒿曰方云一名爛石草至惡瘡可殺也或曰練

石急呼為標千金治蛇螫有柵葉灰先以汴葵柵葉取汁洗拭千內灰創中方所云練石薄即是一曰練石

蓋陵為之轉訛謂車前草也莊子至樂云生於陵屯則為陵為葛氏方治鼠瘻有搗車前草以膏之方所云練

石薄即是姑併錄存疑

廿頁下三行注

有治惡瘻方

在訛

行拌子

千金

作餅

廿一頁上八行

灰酢和付之

千金作和臘月猪脂合燒作灰末之內乳中

廿三頁 女婦草

外臺引千金同方後云劉涓子古今錄驗同今本千金作乳婦薄草疑宋臣私改

不可後也

廿四頁上五行

虫虵

病源作虫蛆

廿五頁下一行注

四起

起恐

廿六頁 劉涓子方

外臺引集驗有瘡子一外共十味方後云古今錄驗劉涓子同

廿八

頁上 海臺

外臺作海藻注一云海客案臺即苔之段借字

行 劉涓子方

外臺引集

驗有白朮礬石各一分共十味
方後云劉涓子古今錄驗同
行注去麴麴翹行五

倒輸外臺作八欲坐病源作吐
上九頁地膠外臺作地膽干

同金行陰蘆根外臺引集驗八汁入病源作下二

劉涓子方外臺引集驗有雌黃芍藥虎脂各一
千薑

一分四字蓋三汁入外臺汁三行濯病源作躍一字

五劉涓子方外臺引集驗有白芷各一分共
十七味方後云劉涓子古今錄驗同

始振外臺始下九行戢病源作戢然上三頁地胆

子金作付水衣付子金作同上四頁搗底子金作

九新寶病源新下一然後病源然

九頁上 石 寄 外臺卷十七首篇引素女經有頭項
二行 石 寄 彊 之 父 蓋 寄 彊 即 彊 之 緩 言 据 此

則 彊 石 之 為 彊 石 稱 明 矣

下 八 行 練 石 薄 新 練 石 草 草 有 名 無 用 新 退 部 黑 字

石 淋 勝 脫 中 結 氣 利 水 道 小 便 陶 注 云 一
名 爛 石 草 又 云 即 馬 矢 蒿 据 此 則 前 說 可
從

醫心方卷第十七

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治丹毒瘡方第一

治癰瘡方第二

治疥瘡方第三

治惡瘡方第四

治契瘡方第五

治復契沸瘡方第六

治浸淫瘡方第七

治玉爛瘡方第八

治反花瘡方第九

治月蝕瘡方第十

治惡露瘡方第十一

治漆瘡方第十二

治癰瘡方第十三

治疽創方第十四

治蠅蝨瘡方第十五

治諸瘡爛不燥方第十六

治諸瘡中風水腫方第十七

治丹毒瘡方第一

病源論云夫丹者人身躰色忽然變赤如丹塗之狀故謂之丹也或發手足或發腹上如手掌大皆風熱惡毒所為重者亦是疽之類不急治則痛不可堪久乃壞爛去膿血數升若發於節間便斷人四肢毒入腹則致人小兒得之最忌

又云白丹者初發癢痛微虛腫如吹麻不起不痛

不赤而白色也アリ由狹風氣故然メル

黑丹者初發生癢痛或燥腫起ツトク微黑色也ルコシ由狹風冷

故色黑

赤丹者初發癰起大者如連錢チ、ホミル小者如麻豆肉上粟々ナル

如鷄冠ヒカ肌理ウツシハ由風毒之重故使赤也亦名茱萸丹丹

者肉色不變又不起但起隱癰相連而微癢故

謂丹軫之

室火丹者發時在腓腸フムラ如柏大二三寸皮色赤而熱之本書腹字

天竈火丹者發時必在於兩股裏モ、衝引トホリ至陰頭而赤

腫是也

癰竈火丹者發時必於足趺上而皮色赤者是也

尿竈火丹者丹發於胃腹及脅連陰頭皆赤是

也

煙火丹者丹發於背亦在於髀皮色赤是也

癰火丹者丹發於髀而散走元常處著處皮赤是也

螢火丹者丹發於髀至脇皮赤是也

石火丹者丹發通身似蠟目妄如粟是也皮色乃

青黑也

小品方云丹毒者方說一名天火也肉中忽有赤如丹

塗赤色也大者如手掌大其裏者竟身體亦有痛痒

微腫者方用

赤小豆二升春下篩以鷄子白和如泥塗之小乾復塗

之逐手消也竟身者倍合之盡復作內宜服漏蘆湯

今案千金方元鷄子但用水和之

漏蘆湯方 漏蘆二兩 白蔞二兩 黃芩二兩

白薇二兩 枳實二兩 升麻二兩 夕藥二兩

大黃二兩 甘草二兩 麻黃二兩

吹咀

麻槁之義
又應細切

凡十物吹咀チクタイ以水一斗煮取三升分三服若是窮

地無藥之處依說增損易服セ之及用後單行方也

能以鋒針チクタイ鑿去血然後傳藥ハクヨ大良增損方法无

漏蘆用艾子チクタイ十枚无白蔘チクタイ之可略耳无黄芩

亦用艾子漏蘆黄芩チクタイ並無者但以艾子一物亦

足已之無外麻用犀屑チクタイ無犀屑用麝チクタイ銜チクタイ无大黃

用苳消无麻黄用葛根无葛根用石膏无白薇

用知母チクタイ无知母用委蕤チクタイ无委蕤用枳實チクタイ夕藥甘

草亦可略耳都无藥但得大黃單服之チクタイ大善

升麻湯治丹癰諸毒腫潰潰方

音卷潰也

升麻二兩 黃芩二兩 艾子クナナシ廿枚 漏蘆二兩

蒴藿根ソクトク五兩 芒消二兩

凡六物以水一斗煮取七升分服之

潰恒濕也

升麻膏治丹癰諸毒腫熱瘡方

升麻二兩 黃芩二兩本書三兩 艾子イタクセ廿枚 白芷二兩

漏蘆二兩 枳實三兩須 連翹二兩 蒴藿根四兩

芒消二兩 地銜三兩

凡十物切春^イ碎^{クタイ}細^イ以水三升漬半日以猪脂^{アフラ}五升

煎令水氣竭^{ハクセ}去滓^ヨ傳諸丹毒腫^ヨ熱瘡上日三

若急須之^{モチナリ}但含水即剪之

又云單用一物春以薄^{ハク}之方。今案集驗方同之

生^キ地^{ウツメ}銜^メ

生地黄

生^{ソクトク}蒴藋葉

生^{イキクセ}慎大葉

生^{タカナ}菰菜葉

生五葉藤春豆^{タル}豉^{クキ}

浮萍^{ウキクセ}

上八物一^レ別搗別塗之

大黃黃芩

艾子

芒消

上四物各春水和各塗之

葛氏方云丹大者惡毒之氣五色元常不即治セ既痛
不可堪又待懷シム則去膿血數升或發於節解多析人
四支蓋癰疽之類治之方ル

又方煮粟蔞有棘刺者イカ以洗之ムハフ
和名久利乃伊加

又方取赤雄雞血和真朱以塗

又方猪膏和胡粉塗之

又方搗麻子ハイ以塗之アセフニ

又方莽菜塗之フックセ

又方以慎火塗之イキクセ

又云治白丹方

重其本元有重其本元

又方漬蟾蜍塗之 未豉以苦酒和塗之

又方搗香藥 若慕傳之

又方燒鹿角以猪膏和塗之

羊蹄之注云一種極相似而味酸呼為酸模

又方搗酸模草五葉者飲汁以滓薄之

又云治卒毒氣攻身或腫或赤或痛或痒淫并外散

上下周匝煩毒欲死方

取生莫切之如膾以塭和傳之通身赤者斂多作令

竟病上千復易之耐莫為佳

集驗方治丹若走皮中侵廣者ヤウヤク名為大丹又レ入腹斂人治之

方取ル蟾ル蟾ル末ル以塗之

又云若通身赤者方

取婦人月布小カレヲモヲ薄之又取汁以浴小兒

又方搗大黃水和塗之

又方搗艾子クチナシ水解塗之

又方水和芒消塗之

范汪方治白丹方

破生鯉イッケハカアル契ア血ル傳之良

千金方治丹神驗方

苦薹菜シキ搗令ツキ厚封隨手

即老餘氣日久來ツカク封使醒ムシ好老止ナラヨシ干則封ツケヨ

又方牛屎塗之干則易之

○
又云赤流腫者ニハ

榆根ヤニシ白皮未鷄子白和塗之

醫門方云凡人面目忽得赤黑丹如疥ツ狀不療遍身即死

方以猪槽下泥塗之豚所寢泥也

又方燒鹿角末和猪脂塗之アフリ

藕敬本草注云搗菟蔚メハシキ薄之

又云亭根鳩^{ツノ}佑^{ユウ}之

握要方丹腫方 生鯽^{フナ}魚肉鳩如泥塗之

博濟安衆方云以連錢^{ハクセ}草以塩^{モムチ}按傅之

崔禹食經云付水中莒良^{カハミトリ}

治癰^{セニカセ}瘡方第二^{チカ佐}

病源論云癰病之狀皮肉上隱癰^{チイホム}如錢文漸々增長或

圓或鉗^{斜ナメ}瘡^{ナメ}痛有匡郭裏生虫^ナ搔之有汁此由風濕耶

氣客於湊理復值寒濕与血氣相搏則血氣^{丁ロカル}否^{阻絶謂之}溢^{フヒカリ}殺^死

此病案九虫論云蛭虫在人腹内變化多端殺動亦

能為癰而癰內實有虫也

養生方云夏不用屋而露面卧露下墮面上令面

皮厚喜成癰也

干癰但有匡郭皮枯索癢搔之白屑出是也皆是

風濕耶氣容於湊理復值寒濕為血氣相搏所生其

風毒氣多濕氣少故風沉入深故元汁為干癰也其

裏生虫

濕癰亦有匡郭也如虫行浸淫之濕癢搔之多汁成

創是其風毒氣淺濕多風少故為濕癰也其裏亦生虫

之風癰是惡風冷氣容在威皮朽於血氣所生亦作圓文

犯ヤレ

匡郭但搔杞頑痺不知痛癢是也其裏亦生虫

徒見及知謝下淺也

白癰之狀白色淀_ニ然_ニ而癢此_ニ是_ニ湊理虛受風_ニ与_ニ氣

并血澁而不能榮肌肉故也

牛癰俗云盃器盛水飲_フ牛用其餘水洗手面即出癰

名為牛癰其狀皮厚新強_{カタクコハリ}而癢_ル是也其裏亦生虫

圓癰之狀作圓文隱起_{シテ、ホミ}四畔赤癢痛_キ是也其裏亦生虫

狗癰俗云狗舐_{イヌ、子フル}之水用洗手面即生癰其狀癢白點綴_セ

相連亦微瘡_ル是也其裏亦生虫

癰之方

雀眼癬亦是風濕所化似細文似於雀眼故謂之雀眼搔

之亦癢裏亦生虫

刀癬俗云以磨刀水用洗手面而生癬名刀癬其狀元

匡郭鋒針元定是也其裏亦生虫

葛氏方治癬瘡方

以好苦酒ヨキ於石上磨桂ル以塗之

又苦酒磨柿根二塗之

又方于蟾蜍ヒキ燒末ヒキ以膏和塗之立愈

又方按菰菜モム塗之

又云治濕癬方

刮瘡上キサ火炙麝脂塗之末ヒルムシロ蛇床子猪膏アブラ和傳之

又方取薜母草ムシクサ以刮癬上取ムシ老止

又云治燥癬方

水銀和胡粉塗之

又方雄雞冠トカ血塗之

又方熬胡粉令黃赤キ色苦酒和如泥傳上以紙帖之3于更塗之

又方鵝桃白皮苦酒和塗老

又方以穀樹汁塗之

千金方治癰秘方

搗羊蹄根分署ツボ中イシ以白蜜和之先刮瘡邊傷

先以蜜和付之若炊一石米頃拭去更以三年

大酢ル和以付癰上燥便老若刮瘡少許處不傷

即不老

又玄凡癰積年不老隨有之處皆用得愈方

取自死地タル燒作灰臈月猪脂和塗即愈

范汪方治癰濕方

取羊蹄根コトカキリ細剉コトカキリ數外以桑薪灰汁煮四五沸

校シホリ去滓以汁洗創

僧深方治癰方

未雄黃酢和先以布拭瘡ウツ令傷以藥塗上神効

不傳

又方附子オウ一枚皂莢カハテフナミ一枚九月九日茱萸ハシカミ四合

石三物下篩為散搔癰上シメ令周遍アチチクヘ汁出ハシカミ以散薄

之若干癰ナラ以若酒和散以塗其上神良秘方

又云治癰積年不愈方

便

取鯁^{ナレ}炙^{ナレ}而食之勿食塩酢三過三食使愈當
時乃當小盛^シ此欲愈^{ナリ}也

又云治蝟癬浸^ヒ瀉^ヒ日長痒痛搔之黃汁出是復發^{一タ}方

日未出時北向取羊蹄根^{シラ子}勿令婦人小兒見洗去

五切鳩淳^{丸ヌル}若酒和洗瘡去^{カセラ}痂^ヨ以傳上一時^ア向^ア以^ア冷

水洗之日一傳又可取根^丸指^ヒ之神良日未出取者

不欲^{ナリ}散^{セム}加根上

樣要方療濕癬方

石以日未出時採取羊蹄根其根須獨^{七五并}並不得

楚加及

有杈枝ヤラハ不得令見風切搗為末和羶羊酪暑

少塩枝也於日中曝而食久以塗癰上ア

又方取椿葉面署癰上用匙背打使極碎是支及筋也

即果衣之勿令葉落元不暑者

又云療乾癰積年痂厚カセフタ搔之黃水出逢陰雨即痒

方右取巴豆肥者一枚枚炭火上燒之令脂出即於各

上以脂研之脂如杏子塗癰上薄塗之不過二兩度

便愈

又方作艾炷ヤイグセ以灸之隨灸隨老

又方搗馬齒汁楷之洗之効

博濟安衆方一切癰癰惡瘡小兒頭瘡方

嘉本无發自本有

以水銀白焚石蛇床子黃連和猪脂傳之

蘇敬本草注東壁土摩之于濕魚治也

陶景本草注云芟茶苦酒並塗之

本草經云楊酢漿草カクハミ薄之斂諸小虫又治惡瘡也

廣利方療諸癰瘡或濕痛癢不可忍方

以醋磨石留黃塗上

又方若練皮燒作灰和猪脂アヲチ塗上

治疥瘡方第三

病洎論云疥有數種有大疥有馬疥有水疥有干

疥有濕疥多生手足乃至遍躰大疥者作創有膿汁

焮赤癢痛是也馬疥者皮肉隱痺起作根蟻搔之

不知痛此二種則重水疥者作瘡癰如瘰癧漿摘破

有水出此一種小輕干疥者但癢搔之皮起作于痂

濕疥者起小創皮薄常有汁出並皆有虫人往々針

頭桃得狀如水內癰虫此恙由皮膚受風邪熱氣

所致也凡虫論云蟻虫多作癰疥

葛氏方治卒得蚘瘡方

猪膏モ煎荒花モ以塗之モ

又方麻油摩流黃塗之

又方石灰二斗以五斗湯洗取汁先拭瘡以此

灰汁洗之

又方東行練根ナリ刮末ナリ苦酒和塗通身者ナラ濃者ツク

以浴佳ヨ

又方酒漬苦茶飲之宇治等元 葛氏方未同云云 ケテ、

集驗方治疥湯方

蜀拊ナルハシカミ四合以水一斗煮三沸去滓令溫洗疥

又方大麻子アセラミ一升搗令破煮如粥カクタク以麴イ一斤署

中塗之治馬疥最良

刪繁方治癬及疥等乱髮膏方

乱髮オホカミ如鴨子大一枚 鯽魚フナ一頭 雄黃二兩

八角オウ附子一枚 苦茶クチャ一兩 猪膏一枚

凡六物煎搗附子三物為末猛火煎猪膏髮魚

令盡內末藥傳瘡上

范汪方治疥水銀膏方

水銀一兩二分

一方二兩

黃連一兩

カクマクセ

黃蘗一兩

キハタ

藍藤一兩

乱髮二分

焼成灰

凡五物鳩下篩和以神明膏三合令相得塗疥

上日三神良

又方羊蹄鳩根猪脂和塗或水与塩

クハヨ

槎要方胡粉膏療疥方

胡粉三兩 水銀二兩

ツヤニ 松脂二兩

猪膏六兩

石煎成去滓内水銀胡粉和調塗瘡上日二

宝印本作三錢

又方若酒摩狼跋子塗之効

アナヲミ

又方用椿木葉ツバキ以煮汁洗之

又方以酢磨練實根塗之アフラ

陶景本草注桺葉者以洗之又方漏盧根クロクセ若酒磨以

傳之

蘓敬本草注取栢枝ヒ燒其下葉取汁レ名諸音諸甚治疥也

本草贅オホカミ云狼血塗之之久疥良忌食メ菓一月永差効

治惡創方第四

病源論云諸創オホコソ生身躰皆是躰虛受風熱と与血

相搏トコカル故發創若風熱ハセメラ挟濕毒之氣者則創癢痛ホトホリ燉

腫而多汁身軀此熱謂之惡創也

養生方銅器蓋食汗入食致惡創肉疽

又云醉而交接凡レ或致惡瘡

又云井水和粉洗之不病惡創

又云飲酒熱未解以冷水洗面令人面發創輕者年三劉涓子方治惡創方

用杏人カラモ、ウセチ熬令黃里豉コカラカセ熬令黑雄膏和傳上

錄驗方甘氏烏膏治天下衆創醫術不能差有

虫者悉治之方

水銀一兩黃連二兩

罌二升

右三物猪膏ニ下カ和クタキ炙カ研調如脂凡リ傳不過二三即

愈秘方僧深方於
潜墨云

范汪方治惡創中生惡肉大挺出方又个ナ

未石上ラアハ留黃傳之有汁又个者未无汁以唾和傳之

僧深方治惡創又个实脱出方

為頭オウ未以傳創中惡实立去佳

千金方治惡瘡方

燒篇タチナナクセ竹灰和猪白汁字治本作猪字發音本未作楷字對ハナヨ

又方河水モ煮白馬矢十沸洗之

又云十年不_{丁チ}耄者

塩湯洗以地黄蒸_サ怙之

又方燒獭猪矢一升付之_{サウヨウクツ}

又方燒苦瓠子未付之_{ニカヒキコ}

又方燒鯽_{フナ}鱼灰和_{ヒシマウ}醬清付之主一切惡瘡

又方以牛矢_{フカヘヨ}熟_{又ル}即愈凡創皆可動

又云惡瘡十年不_{丁チニ}耄似癩方

麝_{サウモ又ノ}脫皮一枚燒之未下_{ハチクタイ}篩猪脂和付之

又方苦瓠一枚_{ニカヒキコ}咬咀_{ハチクタイ}煮取汁洗瘡日三

又云惡瘡名曰匡，齊其大如錢方。

以水煎自死鮑（ハミ）一頭，令爛去骨，以汁塗之，手下是。

葛氏方治大人小兒，卒得諸惡瘡不可名識者方。

燒竹葉以鷄子中黃和塗之。

又方取牛膝根搗塗之。

又方取蟪（イホム）螋（シリ）蛭（イ）絞取汁，傳瘡中，虫即走出。

又方鴈月猪膏一升，亂髮（オハ）如鴨子一枚，生鯽魚頭（フナ）。

合煎令消盡，不沸止。又內未雄（タム）黃（オウ）雌（メ）苦（ク）參（サ）屑（セ）各三。

兩，大附子一枚，令攪（カキ）凝（コ）盛器，以傳（ツケ）諸瘡，元不差。

又云若瘡中惡肉突出者

末烏梅屑ホシムメ傳瘡中佳

搔要方療一切惡瘡十年已上并漏瘡及疥癬ナシ作孔久

不羖方 黃連一兩カクアクセ 蘆茹一兩子アセミ 麝香ヒルカシロ子一兩

礬石一兩別 水銀半兩

右搗篩以上九ル臘月猪脂和如稀泥香灰及少也下水銀令銷盡即

成先以メヨ甘清洗瘡然塗藥訖仍以キタウ黃蘗末ハルホ綿沾粉

之令メヨ不汚衣介カセ

集驗方治惡瘡身躰面目皆爛有汁方

取生與三寸者并少致合搗令熟以塗之ナ終復塗ハカ

又云治惡創方

練子アフチ二升 地榆エヒル子五兩 桃人モ、リ子五兩 苦參クサ五兩

水一斗煮取四升溫洗之

又云惡瘡人不能名者方

取頭垢アカ猪脂和塗瘡中

治契瘡方第五

病源論云諸陽氣在表陽氣盛則表契ナ因運動勞役ドロカリ湊理則虛而開為風耶ラ所容風契相搏ト留於皮膚則

生創初作瘰漿黃汁ナル出風多則瘡熱多則痛而氣乘シ之則多膿而故名熱創之

小品方熱瘡者起瘡便生白膿ナル是也

劉涓子方治卒發熱創方

成長二尺許燒令赤以水二升灌之出灰取汁浴之スル
即愈

錄驗方治熱創黃連粉散方

水銀イセル熬イセル黃連カクダマ胡粉コホ熬イセル 各一兩

凡三物先搗黃連下篩然後合三物熟和之塩湯モ

洗創杖令淨藥付之日二

治复熱沸爛瘡方第六

アセチ 六神篇目元爛字

病洎論云盛復之月人膚湊開易傷風熱毒氣搏
於皮膚則生沸創其狀如湯之沸輕者匝如粟粒重者
契汙浸漬成創因以為名古呼為沸子
新錄方治复月熱沸瘡方

細篩石灰粉上

又方以生桑葉揩上

又方酢漿將煮洗之

又方以水字クモ芹子ナシクセウ搗塗之

又方搗菟糸苗子ナシクセウ搗塗之

令李方治人身體熱沸生創方

樊石四兩焚白善六兩シラハネチ焚

凡二物治ハナシ師先以布拭身乃以藥粉之曰二

今案師說云嚼創者風邪在皮肉間復時垂熱氣

時成創如風矢先痒後痛色赤白隱チハハユル輒如粟米大塗

方柚葉煮水洗之

又方煮艾子クナナシ葉洗之クナナシ研艾子粉之

又方粟粒付之

若契盛赤面者方

茵草シキミ春絞塗并煮洗之

治浸淫瘡方第七

病源論云浸淫瘡是心家有風熱發於肌膚初生

甚小先癢後痛而成創汁出浸淫トシルケル肌肉浸淫漸闊ヒロコリ乃至

遍幹其創若從口出流散四支ル則者輕若從四支生然

後入口則重以其漸ル增長ル因名浸淫創也

葛氏方治卒得浸淫瘡轉廣有汁多起於心不早

醫心方卷十一

十一

治之繞身周逆則斂人方

以鷄冠血塗之

又方牛新矢絞取汁塗之燒以燻之佳

胡鷲

本草云胃院黑聲大者是胡鷲也俗呼為夏雀作窠意長也

又方胡鷲窠末以水和傳之

錄驗方天麻草湯方

天麻草切五升以水一斗五升煮取一斗分洗以斂瘡

瘡也

槎要方療身上瘡汁所着處即成瘡名曰浸淫痒

不止方

黃連一兩

カクツク七

黃蘗一兩

キハタ

蘆茹一兩

チアセ三

礬石一兩

甘草一兩

生胡粉一兩

石鴆甘草已上為散胡粉於鎗子中著イシ熬令

黃和之為散クラ飲傳藥先以若フルキ黍汁洗故帛拭

乾即著藥不過三四度即差

蘄敬本草云ナゲシナカラ生嚼胡麻塗之

集驗方治卒毒氣攻身或腫或赤或痛或痒淫并
分散上下周匝煩毒欲死方

取生魚切之如作鱠以塩和サシ薄之若通身多作

令竟病上乾復易之

千金方治浸淫瘡方

以煎餅契薄之取止神良
トルヤムコトヲ

治王爛瘡方第八

病源論云王爛創者由府藏實契皮膚虛而受風

濕々々トワカル与契相搏故初起作瘰漿漸々王大汁流

浸漬故曰王爛也亦名王灼ハク創ナリ以其初作瘰漿如湯ナリ

火所灼也又名洪燭創其初生如沸湯灑作瘰漿赤

爛如火燭故名洪燭也

葛氏方治大人小兒卒得王灼瘡一名瘰瘡一名王爛

瘡此瘡初起作瘰漿似火瘡故以灼爛為名

燒牛矢篩下以粉之

又方熬秫米令黃里搗以傅

又方煮小豆汁內鷄子紋以洗之良

又方未黃連胡粉油和塗之

小品方有洪燭瘡身上忽生癰瘡如沸湯灑剝者

竟頭面亦有^{ム子}旬腦腰腹通如火湯^{カレ}燥^{ヤケタケ}癰瘡起者是也

治之法

急宜服漏蘆湯下之外宜以升麻湯浴但倍分

多煮之以浴滄之其間傳升麻膏佳若窮

地无藥者但依治丹法用单行草茺方也

千金方
同

范汪方治玉爛瘡方

大麻子^{下サノミ}大豆^丸等葶筍中内^{之波}契炙^之葶筍頭取汁

塗創上并過愈

僧深方治玉爛瘡方

胡粉燒令黄青木香 龍骨 滑石

各三兩

石四物治諸畢^{ハトキヲコ}以^ハ染粉^ハ一升和之稍^ハ粉瘡上

日四五愈

治及花瘡方第九

病源論云及花創者由風毒熱相搏所為初生如飯粒其頭破即血出便生惡肉漸大有膿出肉及散如花狀因名及花創凡諸惡創久不老者亦惡肉及出如及花散

龍門方治及花瘡方

取桺樹枝素為煎塗之大驗

又方燒馬齒草今上灰付之驗今業千金方鶴對之

千金方及花瘡方并治積年諸瘡不老者

取鼠粘草

キタキル
牛蒡一名

根細切コチカ

契搗和臘月猪膏對之取

老上并一切久不老諸腫惡瘡漏皆老太神驗

又方取蜘蛛クモ慢怙瘡上數易之神驗

救急單驗方療又花瘡方燒塩未拊ハナ驗

治月蝕瘡方第十

病源論云創生於兩耳及鼻面間并下部下部諸孔竅

側侵食乃至筋骨月初則創盛月末則創衰以其

隨月死生因名之為月蝕創也

又小兒耳下生創亦名月蝕也云小兒見月以手指

之則令病此創也其諸孔竅有虫久不瘳即變成瘻也
葛氏方治大人小兒卒得月食瘡方

於月望夕取菟矢仍内ナハナ以內蝦蟇腹中合燒未以傳

瘡上驗

又方取羅摩カハミ草汁塗

又方燒剗矢アハハ令赤膏和傳

集驗方治月蝕瘡方

數皮如手淳丸又ル若酒三升漬一宿以塗創上

又方煮タル枯鮑魚アハヒ以洒アラハ

范汪方治月蝕創諸惡創方

燒仇道ヒキ未傳之創元汁者膏和塗之可以蝦蟇

膏塗之

令李方治月蝕創菜萸根散菜方用

菜萸根カラハシカミ

廬薔薇根ルハラ各二兩

凡二物治合下篩生塩作湯洗創以散粉上日三

龍華方治月蝕創骨出方

猪脂和杏人付之良

治惡露瘡方第士

小品方云凡八九月刺手足以犯惡露致人不輕也
治之方用生竹若桑支兩三枚セウリイシ鬱セウリ著火中為椎引
之令極契クダキ研碎ツグキ斷之ツグキ以頭ハツゴヨ注創口上契盡復易
著一枚盡三枚則創當正白爛乃取薤白擣以
綿裹之著契灰中使極契チ乃去綿取薤以薄創
上以布帛急裹之若創故腫者モトタラ更灸之若已中水
及惡露風寒腫痛者以塩數合急折著創上以
火灸之令契達創中畢以臈トク內竹管中以管貯
契灰中炮之臈イリホ洋トクヌル以灌創若元塩薤者但臈

便可單用

又云治惡露創方

垢苦盛及陷也亦與坎同

取補若敗青布於小口器中若垢中燒フ丸ヘヨ以敷之

創中汁出盡則愈

千金方云取薤藁之以薄創口上以火灸之令熱徹創ト亦也

中便愈

治凍瘡方第十二

病源論云凍有毒人有稟性畏凍但見凍便中其毒

喜面癢コソム然後カル胃脘ムチヒチ脰モ膈コムラ皆悉怪癢面為起腫先眼

級赤諸所瘡^{オホヨソ}處以手搔之隨手輦展起赤瘡^キ癰

消已生細粟^{ナシ}創甚瘡有膿中毒輕者證候如此其有

重者遍身作創小有如麻豆大者如棗杏^{ナシ}膿^{ナシ}然^{コトク}疼

痛^{ナシ}槌破小定在小者^{ナシ}隨次更生若火燒^{ナシ}凍其毒氣

則厲暑人急重亦有性自耐者終日燒^{ナシ}莫^{ナシ}竟不為^{ナシ}害

瘡^{ナシ}清方療凍瘡腫痛方

嚼^{カム}糯米^{モチウヨガ}傳上四五度老^{ナシ}忘^{ナシ}熱^{ナシ}麵^{ナシ}飲酒

葛氏方治卒得^{ナシ}凍瘡方

以雞子黃塗之千復塗不過三

又方煮桺葉適寒溫以洗之

又方搗薤令如泥以塗之

又方搗蟹カニ塗之

又方爵キミ林米ミ塗之

又方煮香藥イ又エ漬洗之

又方按慎火若雞腸草ハクヘラ以塗之

樣要方療漆瘡方

塩湯洗之

又方馬尿塗之

耆婆方治凍瘡方

花菜汁塗之エ

オホエ

ナレハカミ

又方煮生栴湯洗上

又方△又艾子和水塗之クナオシ

范汪方治凍瘡方

用芒消二合一方五兩以水一升漬自消色縹ハナタ以洗之

一方湯漬

錄驗方治凍瘡方

黃櫨木ハシ一斤聖鹽九一合以水一斗煮取五升去滓以洗神方

救急單驗方療凍瘡方

以水五升煮栴一升十餘沸去栴以水洗豆荳栴今耆婆方煮生

集驗方治凍瘡洗湯方瘡

集驗方治凍瘡洗湯方

蓮葉燦者カレクル一斤以水一斗煮得五升洗滌瘡上日二

又方取猪膏塗之

又方宜散肥肉クツク

陶景本草注云削杉材カハミトリ作柿コナラ煮洗滌元不老

崔禹食經云付水中苔良

治癰瘡方弟十三

病源論云癰創者カハミトリ由膚腠虛風濕之氣析ハナレ於血氣

結聚所生多暑手足間匝々相對如新生菜ハハミ黃子痛カラハミカミ

瘡ヤブ犯搔成創黃汁出浸淫生長ハナレ折裂衣時暑時裂變

化生虫亦名癰創又有瘰癧濕癰候

葛氏方治卒得輜瘡々々常對在兩脚及手足指又隨月生死方

以白犬血塗之立愈

又方以苦酒ル和黃灰塗之

又方搗桃葉以苦酒和瘡上塗之

又方煮苦酒沸以生韭ミツ一杞ミツ內中熟出以薄瘡上即愈

又方オキ乱髮カクハリスガヒ頭垢カクハリスガヒ分等蝸牛殼カクハリスガヒ二十七枚合燒末臘月猪

膏和傳之

僧深方治癰方

取石上昌蒲鴉猪膏和付瘡厚二分先洗去^{カセフタ}痂

又方灸瘡上最良

千金方凡一切癰瘡方

灸足大指^{ハセ}竒間^{二七} 姑

又灸大指頭亦佳

又方酢一升^モ炒^{イリ}薤一^ハ把^ホ葛^ヲ之

又方灸^{ハシ}鮮^{ハシ}薄上

又方炒臘月^{ハシ}糖^{ハシ}薄上

又方燒故履糸末付之

又方燒肥松取脂塗之

又云燥癰方酢和灰塗

又方契牛屎塗之

又云濕癰方燒于蝦蟆猪脂和付之

錄驗方云薰菁子ナタチ一升契下從以絹裹之展轉瘡上ヲハテ

三廣浴方療癰久不差方

取豉クキ為末ナメル以ナメル糲漬洗干拭シ又和麻油塗上以故

油衣裹三日ナメル用

治疽創方第十四

病源論云疽創是癰之類也非癰疽之類也云 癰
 疽即是此也多發於^{ハキ}支節脚脛間相對生匝作細
 孔如針頭其裏有^{カナカリ}虫蟻痛搔之黃汁出隨老隨發
 發皆風耶容於皮膚血氣之所變生亦有^田因諸淺創^創生
 久不^{ナリ}差瘡痛^{ナリ}犯搔之或指拂之其創^創鮮久不^{ナリ}差而變作疽
 創者而創裏皆生細虫

僧深方治男女面疽癰疥癰疽諸瘡方

附子十五枚

蜀椒ナレハシカ三一升

治^{鈎吻一名}葛一尺五寸

去心

右三物^{ヤクク}吹咀^{ツキ}以^テ苦酒漬一宿猪膏二升^モ煎附子

黄膏^{トキニ}成^ニ摩瘡亦治傷寒宿食不消^ヲ消服如棗

覆取^{フキ}汗^ヲ

鍾驗方治疽瘡有虫痒附子散方

附子八分^{イリフ} 蛇^{ヤノハ} 梨蘆二^カ 艾^{イル}

凡二物^{イキ}治^{イキ}合^{イキ}下^{イキ}疔^{イキ}肉瘡中當有虫出日三

范汪方治疽創方用

胡粉^コ以^テ猪膏和如泥^ヲ傳瘡上良

劉涓子方治疽創方

烏賊魚骨作屑鯽魚膽十四枚和取与散令傳

創上不三愈

治蠶螫瘡方第十五

葛氏方治卒得蠶螫瘡方此瘡常繞人腰脇甚急痛

塩三升以水一斗煮取六升及契以綿浸湯中檢

瘡上又方燒庶角苦酒和塗之

又方練皮及校燒作灰傳之

又方未赤小豆苦酒和塗后燂者猪膏和塗

又方胡粉塗之

又^方未^方蚯蚓矢傳之

小品方云有蛛蟻垂尿人斃便令人病也其狀身中忽有

震慄痛如芒刺亦如虫所^{ツキ}吮^{ツル}螫然後起細瘡^{ツル}癰作聚

如茱萸子狀也其瘡^{ハシカミ}癰邊赤中失有白膿如粟粒

是也亦令人皮肉急劇惡寒壯熱劇者連起^{ハイレキ}竟腰

脇胸背也

初得便以水摩犀角塗之以止其毒治之如火

丹法并諸草葉單行治也

又云蛛蟻尿人初未發瘡之時欲与射公相似射公

瘡正有一處豎里^{カハヤ}蛛蟻瘡^{ヒキ}瘡^{ヒキ}連聚作^{ヒキ}楊瘤法亦

小^シ癰^{キヨム}以^ヨ為^ホ異耳然^{トモ}非^{トモ}致^{トモ}人疾也^{虚磨多}

千金方蛛蟻尿瘡方

取^{ハク}廁前^{セシ}人尿泥^{セシ}塗^{セシ}三^{セシ}君^{セシ}地^{セシ}驗^{セシ}更^{セシ}不^{セシ}須^{セシ}餘^{セシ}方

又^方爵大^方麦^方付^方之^方曰^方三

又^方方^方楊^方豉^方對^方上^方

又^方就^方火^方爵^方梨^方菜^方塗^方 權要方同^方

權要方療^方蟬^方蟻^方尿^方瘡^方集^方之^方然^方黃^方水^方出^方方

爵桂^方塗^方之^方

甘草湯洗之

又^方搗韭汁塗之

又^方嚼麻子塗之

又方^{キハク}荳藥末和猪脂塗上明日以塩湯洗

又方嚼桂塗之

如意方治蠹^{ハクヘラ}蝨瘡術

按^{ハクヘラ}鷄腸草傳之

廣濟方療蠹^{ハクヘラ}蝨尿繞腰欲死方

取敗蒲扇^{カシ}煮取汁洗之

又方取篇豆葉アキトメ搗汁塗之立効

集驗方治蠱瘰方

槐白皮半斤切以苦酒二升漬半日キセケ刮去瘰癧

以洗日五六

又方以猪脂カハキ鷓鴣巢中土苦酒和以傳之

治諸瘡爛不肯燥方カハキ第十六

醫門方云諸瘡爛不肯燥方

桺白皮燒末傳瘡上湯火瘡用栳ヒ白皮亦佳

救急單驗方洗百瘡方

取槐白皮栢葉各一大握キリ剉ニキリ以水三升煮取

一升洗百瘡並炙

治諸瘡中風水腫方第十七

僧深方治創中風水腫方

炭白灰一分 胡粉一分

凡二物以猪脂和塗創腫孔上即水出痛心

大良

葛氏方治因創而腫皆坐中水及中風寒所作也其腫入腹則斂人治之方

素灰汁温以漬之大良

又方燒白茅為灰以温湯和之以厚封創口于

輒易凡十八十不過四五千金方月之

范汪易方治諸創因風致腫方

取樛木根イキヒコ但剥取皮卅斤剉煮令熟キリ內藍

一把一方塩一升令温契不盡也以漬イ創膿血當出

日々為之則愈今案葛氏方无藍有塩
千金方以水三石煮

龍門方治凡瘡中風水腫痛方

取青葱葉及乾黃葉和煮作湯契浸之

又方オホニルクセ莨菪根ヲ燒令契シ微切頭契シ注瘡上シ冷易

集驗方治因瘡腫キ劇者ヲ數日死或中風寒或中水

或中狐尿ヲ棘刺方ハハラ

燒穰草及牛馬尿生キ束條エタ趣得ル多烟者キ勲シ

令汁出則愈

今素葛氏方
黍稻穰云々

醫心方卷第十七

醫心方卷第十七札記

二頁上 九行 衝引病源衝 下七 於路病源於 三頁上 白

發千金作 四頁上 芒消二雨此以下仁 七行 救千金

作四 下五 生虵衝外臺引小品此上有水 六行 豆

致仁和尚 豆踐外臺 五行 丹大外臺引肘後

寺本作 待懷外臺懷作懷 四行 粟仁和尚 寺本作

丹火 仁和尚 寺本作 餘氣千金餘下 七頁上 六

行 錢文病源作 下二 不用屋而病源作 八頁上 搔

把仁和寺本作 三行 淀仁和寺本作 二頁上 聲宋韻

醫心方卷十七札記

卷八下 方一 才言

源色也病 下四 鋒鉞和奇本 九頁上 剗瘡

上火灸康脂塗之外臺引肘後作刮瘡 十頁上 校去

校印校 下六 未出仁和尚奇本 十一頁 椿葉外臺

氏作搯菜仁和尚奇 七頁 脂研仁和尚奇本 外臺 如杏

予外臺作如杏 十二頁 义方仁和尚奇本 十三頁 搗

根仁和尚奇本 十四頁 洗之病源之 十五頁 猪白仁

奇本猪作 十四頁 王大仁和尚奇本 十六頁 馬齒

草千金草 下三 蜘蛛慎怡 十六頁 赤膏外臺引肘後赤下

頁上 其諸仁和尚奇本 十六頁 赤膏外臺引肘後赤下

一行 其諸仁和尚奇本 十六頁 赤膏外臺引肘後赤下

下二 仇道 本車和名蝦蟇一 廿五頁 瘡癰 仁和寺

二字重南源同此本 三小有 仁和寺本有 然疼 和

寺本作嫩 上八行 救急 仁和寺本 下六行 犯搔 和

寺本作抓 或措 仁和寺本 廿九頁 練皮 仁和寺

練下有 廿頁上 蛛蝮 紫蛛蝮也玉篇 廿三

六作 四 中失 仁和寺本 八 草菜 仁和寺本 廿三

四 勲之令 仁和寺本

卷之二

二

一六〇〇

醫 心 方 四

日 本 古 典 全 集 之 內

編纂者

正 宗 敏 夫

發行者

東京市豊島區長崎町三丁目一六一
會社 日本 古典全集發行會
代表社員 長 嶋 東 一

印刷者

東京市芝區金杉新町一二
單式印刷株式會社 和田助一


發行所

東京市豊島區長崎町三丁目五
會社 日本 古典全集刊行會
振替東京七三〇三二

昭和十年五月十四日印刷
昭和十年五月二十日發行

【非 賣 品】







UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER
COLLECTION

*purchased from
a gift by*

THE DONNER CANADIAN
FOUNDATION

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03056 4835

